



تعليم المريض / مقدم الرعاية

كيف تعطي نفسك حقنة فيلجراستيم (®Neupogen) أو بيجفيلجراستيم (®Neulasta) باستخدام محقن مُعبأ مسبقًا

تساعدك هذه المعلومات في تعلم كيفية إعطاء نفسك حقنة فيلجراستيم (Neupogen) أو بيجفيلجراستيم (Neulasta) تحت الجلد باستخدام محقن مُعبأ مسبقًا. تُعطى هذه الحقنة تحت الجلد. المحقن المُعبأ مسبقًا هو عبارة عن محقن يحتوي بداخله على الدواء.

سيوضح لك مقدم الرعاية الصحية كيفية إعطاء نفسك حقنة تحت الجلد. يمكنك استخدام المعلومات الواردة في هذا المصدر لتتذكر طريقة تلقي الحقنة في المنزل.

معلومات عن الدواء

اسم الدواء: _____

مواعيد الدواء: _____

الجرعة: _____

كيفية تخزين المحاقن المُعبأة مسبقًا

- قم بتخزين المحاقن المُعبأة مسبقًا في الثلاجة. وتجنب تخزينها في المُجمد.

- إذا تجمد الدواء بداخل المحقن، فضع المحقن بالقرب من الجزء الأمامي داخل الثلاجة أو على أحد أرفف باب الثلاجة. فهذا سيساعد على ذوبانه.

- إذا تجمد الدواء داخل المحقن أكثر من مرة، فلا تستخدمه. اتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك للحصول تعليمات بشأن ما يجب عليك فعله بعد ذلك.

- يمكنك ترك محقن مُعبأ مسبقًا في درجة حرارة الغرفة لمدة تصل إلى 24 ساعة. درجة حرارة الغرفة هي 68 ° فهرنهايت إلى 77 ° فهرنهايت (20 ° مئوية إلى 25 ° مئوية). ولا تتركها تحت أشعة الشمس المباشرة.

- لا تترك المحقن المُعبأ مسبقًا في درجة حرارة الغرفة لمدة تزيد عن 24 ساعة. وإن لم تستخدمه، فضعه مجددًا في الثلاجة.

- إذا تركت المحقن المُعبأ مسبقًا في درجة حرارة الغرفة لمدة تزيد عن 24 ساعة، فلا تستخدمه. اتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك للحصول تعليمات بشأن ما يجب عليك فعله بعد ذلك.

- إذا كنت لديك أسئلة بشأن كيفية تخزين أو حمل المحاقن المُعبأة مسبقًا أثناء السفر، فاستشر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أو الصيدلي.

كيف تعطي نفسك حقنة

اجمع المستلزمات

ضع مستلزماتك على سطح نظيف ومستوى (مثل طاولة أو منضدة). يمكنك إجراء هذه العملية في الحمام إذا كان خاصًا وإذا توفرت به المساحة الكافية.

ستحتاج إلى:

- محقن واحد مُعبأ مسبقًا مع واقي حماية بلاستيكي
- مسحة كحولية واحدة
- >وية بلاستيكية فارغة صلبة مزودة بغطاء علوي لولبي (مثل زجاجة سائل الغسيل) لإلقاء المحقن به بعد استخدامه. للاطلاع على تعليمات حول كيفية اختيار >وية بلاستيكية، اقرأ *How to Store and Get Rid of Your Home Medical Sharps* (<https://sandbox18.mskcc.org/cancer-care/patient-education/how-store-and-dispose-your-home-medical-sharps>).

- ضمادة شاش أو كرة قطنية واحدة (بوصتان × بوصتان)
- ضمادة واحدة (مثل Band-Aid®)

قم بإعداد المحقن.

1. أخرج المحقن المُعبأ مسبقًا من الثلاجة قبل 30 دقيقة من تلقي الحقنة. يجب أن يتخذ الدواء درجة حرارة الغرفة عند حقنه.
2. تجنب رج المحقن. فقد يؤدي ذلك إلى تلف الدواء الموجود بداخله. إذا تم رج المحقن، فقد يبدو الدواء بداخله رغويًا ولا ينبغي عليك استخدامه.
3. افحص الدواء للتحقق مما يلي:
 - الاسم - تأكد من مطابقة اسم الدواء لذلك الذي وصفه لك مقدم الرعاية الصحية. الاسم مدرج على العبوة أو على ملصق المحقن.
 - تاريخ انتهاء الصلاحية - تأكد أن تاريخ انتهاء الصلاحية المُدون على

المحقن لم يمر بعد. وإذا كان التاريخ قد مر، فتخلص من المحقن في الدّوية البلاستيكية.

- الجرعة - تأكد من مطابقة جرعة الدواء لتلك التي وصفها لك مقدم الرعاية الصحية. الجرعة مدرجة على النقطة الملونة على العبوة.
- اللون - تأكد أن الدواء في المحقن شفاف وعديم اللون. ولا تستخدمه إن كان يبدو رغويًا، أو غائمًا أو له أي لون أو به بلورات (جزيئات صلبة).

تجنب استخدام المحقن في الحالات التالية:

- عدم تطابق اسم الدواء أو الجرعة مع ما وصفه لك مقدم الرعاية الصحية.
 - انتهاء صلاحية الدواء.
 - الدواء رغويًا أو غائمًا أو له أي لون أو به بلورات (جزيئات صلبة).
- إذا كان لديك محقن آخر، فاستخدمه بدلاً من ذلك المحقن. ثم اتصل بمقدم الرعاية الصحية أو الصيدلي لإخباره بما حدث. قد يتسنى لك إحضار المحقن غير المستخدم إلى الصيدلية المحلية حتى يمكنهم استبداله.

اختيار موضع الحقن

الشكل 1. مواضع الحقن⁴. اختر موضع الحقن الذي يتيح لك ضم بوصة إلى بوصتين (2.5 إلى 5 سنتيمترات) من الجلد لطيه. يُفضل استخدام أحد المواضع التالية (انظر الشكل

(1):

- الجزء الأمامي لأعلى ذراعيك

○ بطنك، باستثناء الجزء المحيط بالسرة على بُعد بوصتين (5 سنتيمترات)

○ الجزء الأمامي الأوسط أو الخارجي الأوسط لفخذيك

○ الأجزاء العلوية للمؤخرة (المقعدة)، فقد إذا كان شخص آخر سيقوم بحقنك

○ الجزء الخلفي لأعلى الذراعين، فقط إذا كان شخص آخر سيقوم بحقنك
اختر موضع حقن مختلفاً كل مرة. من المفيد استخدام دفتر ملاحظات أو تقويم لتتبع المواضع. يساعد تغيير مواضع الحقن في تخفيف الشعور بالألم ويمنع تكوّن تندب في الأنسجة. وقد يعوق تندب الأنسجة فاعلية الدواء وعمله على النحو المرجو. وسيجعل من الصعب إدخال الإبرة في الجلد.

تجنب الحقن في موضع مؤلم أو أحمر اللون أو به كدمة أو صلباً أو به ندبات أو علامات تمدد.

5. قم بطني أي ملابس تغطي موضع الحقن.

6. مزّق أي 3 حواف على حزمة ضمادة كحولية محكمة الإغلاق. احمل الحزمة من الحافة التي لم تمزقها. افتح الحزمة بحرص للكشف عن الضمادة الكحولية، ولكن لا تخرجها الآن. ضع الحزمة المفتوحة على منطقة العمل النظيفة لديك. ستستخدم هذه الضمادة الكحولية لتنظيف الجلد في موضع الحقن قبل إعطاء نفسك الحقنة مباشرة.

إعطاء نفسك الحقنة

يُفضل أن تعطي نفسك الحقنة أثناء الوقوف. إذا كنت جالساً أو مستلقياً، فربما يصعب عليك رؤية موضع الحقن. وإذا كنت تشعر براحة أكبر أثناء

الجلوس أو الاستلقاء، فاطلب من شخص آخر، مثل متعهد الرعاية، إعطاء لك. تأكد أن مقدم الرعاية الصحية قد أوضح لهذا الشخص كيفية إعطائك الحقنة.

7. اغسل يديك جيدًا بالصابون والماء أو استخدم معقم يدين كحوليًا.
 - إذا كنت تغسل يديك بالماء والصابون، فبلل يديك بالماء الدافئ واستخدم الصابون. افرك يديك معًا لمدة 20 ثانية على الأقل، ثم اشطفهم. جفف يديك بمنديل ورقي. واستخدم نفس المنديل لإغلاق الصنبور.
 - إذا كنت تستخدم معقم يدين كحوليًا، فاحرص على تغطية جميع أجزاء يديك بالكامل به. افرك يديك ببعضهم بعضًا حتى يجف.
8. أخرج المحقن من عبوته.

9.

الشكل 2. انزع غطاء الإبرة

استخدم يدك المهيمنة (التي تكتب به) واحمل المحقن من الجزء الأوسط، مثل القلم أو السهم. اسحب غطاء الإبرة برفق بشكل مستقيم (انظر الشكل 2) وتخلص منه بإلقائه في الحاوية البلاستيكية. بمجرد رفع غطاء الإبرة، لا توجه المحقن للأسفل. ولا تسمح لأي شيء، به في ذلك أصابعك، بلمس الإبرة. وإذا لمس أي شيء الإبرة، فتخلص من المحقن بإلقائه في الحاوية البلاستيكية. وابدأ استخدام محقن جديد. بعد تلقي الحقنة، اتصل بمقدم الرعاية الصحية لإخباره بما حدث.

1. افحص المحقن للكشف عن الفقاعات الهوائية. وإذا شاهدت أيًا منها، فاحمل المحقن موجهًا للإبرة لأعلى. اطرق برفق على جانب المحقن بأصابعك حتى ترتفع الفقاعات الهوائية إلى الأعلى بالقرب من الإبرة. اضغط على المكبس ببطء لأعلى لدفع الفقاعات الهوائية خارج المحقن.

واحرص على عدم دفع أي دواء للخارج.

1. التقط الضمادة الكحولية بيدك الأخرى. قم بتنظيف الجلد في موضع الحقن بالضغط عليه برفق. ابدأ من منتصف الموضع وتحرك للخارج في حركة دائرية. دع جلدك يجف في الهواء قبل حقن نفسك. ولا تقم بتهوية أو نفخ موضع الحقن لتسريع عملية التجفيف.

1. تأكد أنك لا تزال تحمل المحقن من الجزء الأوسط، مثل القلم أو السهم. استخدم يدك الأخرى لضم طية من الجلد بمقدار بوصة إلى بوصتين (2.5 إلى 5 سنتيمترات) في موضع الحقن.

الشكل 3: إدخال الإبرة بالكامل في الجلد
13. ادفع الإبرة بأكملها للأسفل في اتجاه مستقيم في موضع الحقن الذي قمت بضمه وطيّه بحركة واحدة سريعة وخفيفة (انظر الشكل 3). لا تضع الإبرم على المكبس في هذا الوقت.

1. بعد إدخال الإبرة، اترك الجلد. استخدم إصبع الإبرم (في أية من اليدين بما يحقق لك الراحة) لدفع المكبس ببطء للأسفل بالكامل. ادفعه حتى يتم حقن الدواء بالكامل (انظر الشكل 4).

الشكل
4.
اضغط
على
المكبس
للأسفل
حتى آخر
المسافة

1. عندما يفرغ المحقن، أخرجه من الجلد بشكل مستقيم. ضع كرة قطنية أو ضمادة شاش على موضع الحقن واضغط عليها برفق لبضع ثوانٍ. ضع ضمادة على موضع الحقن عند اللزوم. تجنب فرك موضع الحقن أو الضغط عليه بقوة.

1. سيأتي المحقن مزودًا بواقي حمّية تلقائي أو واقي حمّية يدوي حسب نوع الدواء الذي تتناوله. بالنسبة لواقي الحمّية التلقائي، سينزلق واقي الحمّية تلقائيًا فوق الإبرة لتغطيتها. بالنسبة لواقي الحمّية اليدوي، فستستخدم يديك لتحريك واقي الحمّية فوق الإبرة لتغطيتها.

○ إذا كان المحقن لديك مزودًا بواقي حمّية تلقائي: ارفع يدك عن المكبس ببطء. سيتحرك واقي الحمّية تلقائيًا فوق الإبرة حتى يغطيها بالكامل. ستسمع صوت استقرار واقي الحمّية في مكانه.

○ إذا كان المحقن مزودًا بواقي حمّية يدوي: توخ الحذر لعدم وخز نفسك بالإبرة. أمسك موضع قبضات الأصابع البلاستيكية الشفافة على جانبي المحقن بإحدى يديك. احمل واقي الحمّية بيدك الأخرى. حرّك واقي الحمّية فوق الإبرة حتى تتم تغطية الإبرة بالكامل (انظر الشكل 5). ستسمع صوت استقرار واقي الحمّية في مكانه.

الشكل
5.
حرّك
واقى
الحمّية
حتى
يستقر
في
موضعه
ويغطي
الإبرة.

1. تخلص من المحقن في الحاوية البلاستيكية. لا تستخدم المحقن المُعبأ مسبقاً أكثر من مرة واحدة.

كيفية تخزين المحاقن المستعملة والتخلص منها

احتفظ بدوّيتك البلاستيكية في مكان آمن. اقرأ *How to Store and Get Rid of Your Home Medical Sharps*

(<https://sandbox18.mskcc.org/cancer-care/patient-education/how-store-and-dispose-your-home-medical-sharps>)

للإطلاع على معلومات حول اختيار الحاوية البلاستيكية والتخلص من المحاقن والأدوات الحادة الطبية المنزلية المستعملة الأخرى.

متى يجب الاتصال بمقدم الرعاية الصحية

اتصل بمقدم الرعاية الصحية في الحالات التالية:

- إذا لم يتوقف النزيف في موضع الحقن
- إذا شعرت بألم حاد في موضع الحقن

- إذا حقنت الدواء في موضع غير صحيح
- الإصابة بحمى وارتفاع درجة حرارتك إلى 100.4 فهرنهايت (38 مئوية) أو أعلى
- إذا ظهرت عليك علامات على تفاعل الحساسية، مثل التورم أو الاحمرار أو الحكة أو الطفح الجلدي في موضع الحقن أو في أي موضع آخر في الجسم.
- إذا لم يكن بوسعك استخدام المحقن لأن الدواء منتهي الصلاحية (تاريخ انتهاء الصلاحية المُبين على المحقن قد مر بالفعل) أو رغوي أو غائم أو له أي لون أو به بلورات (جزئيات صلبة).
- إذا لم يكن بوسعك استخدام المحقن بسبب لمس الإبرة قبل الحقن.
- إذا وجدت صعوبة في حقن نفسك.
- إذا كانت لديك أي أسئلة حول كيفية حقن نفسك بشكل صحيح

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000

لمزيد من الموارد، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.mskcc.org/pe للبحث في مكتبتنا الإلكترونية.

How to Give Yourself an Injection of Filgrastim (Neupogen®) or Pegfilgrastim (Neulasta®) Using a Prefilled Syringe - Last updated on August 1, 2023

جميع الحقوق مملوكة ومحفوظة لمركز Memorial Sloan Kettering لعلاج السرطان