



تعليم المريض / مقدم الرعاية

البرد (الإنفلونزا)

تشرح هذه المعلومات تفاصيل حول نزلات البرد (الإنفلونزا)، بما في ذلك كيفية انتشارها وكيف يمكنك تقليل خطر الإصابة بها.

ما المقصود بنزلات البرد (الإنفلونزا)؟

تحدث الإصابة بالبرد (الإنفلونزا) بسبب فيروس (جرثومة) مما يؤثر على جهازك التنفسي ويمكن أن يسبب ذلك العدوى. ويضم الجهاز التنفسي الأنف والحلق والرئتين.

يمكن أن يكون (البرد) الإنفلونزا مرضًا خطيرًا للأشخاص المصابين بالسرطان أو بأمراض أخرى. وقد يكون خطيرًا أيضًا لمن يعانون من ضعف في جهاز المناعة. يتكون جهازك المناعي من خلايا وأنسجة وأعضاء تساعد جسمك على مقاومة الأمراض. يمكن أن يضعف السرطان وعلاجات السرطان، مثل العلاج الكيميائي، جهاز المناعة لديك. وقد يجعل ذلك من الصعب عليك مكافحة البرد (الإنفلونزا). وقد يجعلك أيضًا أكثر عرضةً لمشاكل أخرى إذا أُصبت بالبرد (الإنفلونزا).

ما المعلومات التي يجب أن أعرفها عن البرد (الإنفلونزا) وفيروس كورونا (كوفيد-19)؟

نظرًا لوجود جائحة كورونا (كوفيد-19)، من المهم أن تحمي نفسك من الإصابة بالبرد (الإنفلونزا). قد يكون الأشخاص المصابين بالسرطان أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات برغم أننا لا نعرف الكثير عما يحدث إذا أُصبت

بالأنفلونزا وفيروس كورونا (كوفيد-19) معاً. ولهذا السبب، يكون من المهم تلقي حقنة البرد (الأنفلونزا).

إذا كنت مصاباً بالسرطان أو تعيش مع شخص مصاب به، فيجب عليك حماية نفسك وعائلتك من خلال تلقي حقنة البرد (الأنفلونزا). تذكر أيضاً اتباع إرشادات **مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها**، مثل **غسل يديك** لمدة 20 ثانية على الأقل، والحفاظ على مسافة آمنة لا تقل عن 6 أقدام بعيداً عن الأشخاص الآخرين، وارتداء قناع.

لمزيد من المعلومات حول كيفية حماية نفسك من البرد (الأنفلونزا)، يمكنك قراءة قسم "ما الذي يمكنني فعله لتقليل مخاطر إصابتي بالبرد (الأنفلونزا) أو نقلها للآخرين؟" من هذا المصدر.

هل من الآمن تلقي حقنة البرد (الإنفلوآنزا) ولقاح فيروس كورونا (كوفيد-19) في نفس الوقت؟

نعم، من الآمن الحصول على لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19) واللقاحات الأخرى مع حقنة البرد (الإنفلوآنزا). ولن تكون مضطراً للانتظار أي مدة فيما بينهما. ومن المهم أن تحمي نفسك من فيروس كورونا (كوفيد-19) والبرد (الإنفلوآنزا).

ما هي أعراض الإنفلوآنزا؟

إذا أُصبت بالإإنفلوآنزا، فقد تظهر عليك واحدة أو أكثر من الأعراض التالية:

- حمى تزيد عن 100.4 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية) أو حسب توجيهات مقدم الرعاية الصحية.

- التهاب الحلق
- الرعشة
- السعال
- مشاكل في التنفس (مثل ضيق التنفس أو ضيق الصدر)
- الصداع
- سيلان الأنف
- آلام في الجسم
- التعب والشعور العام بعدم الارتياح

تشابه العديد من أعراض الإنفلونزا مع أعراض فيروس كورونا (كوفيد-19). إذا كنت تعتقد أن لديك هذه الأعراض، فاتصل بمقدم الرعاية الصحية على الفور.

كيف تنتقل عدوى البرد (الإنفلونزا)؟

تنقل عدوى البرد (الإنفلونزا) من خلال ملامسة الرذاذ المتطاير من أنف وحلق شخص مصاب. يُطلق الشخص المصابة الرذاذ الذي يحمل الفيروس في الهواء عند العطس أو السعال. ويمكنك بسهولة أن تنفس (تستنشق) هذا الرذاذ وتصاب بالعدوى.

يمكن أن تنتقل عدوى البرد (الإنفلونزا) أيضاً عندما يسقط هذا الرذاذ على الأسطح المحيطة بشخص مصاب. إذا لمست السطح ثم لمست أنفك أو فمك أو عينيك، فقد تصاب بهذه العدواي.

ما الذي يمكنني فعله لتقليل مخاطر إصابتي بالبرد (الإنفلونزا) أو نقلها للآخرين؟

- تلقي حقنة البرد (الأنفلونزا) كل عام.
- اطلب من أفراد الأسرة والأصدقاء المقربين تلقي حقنة البرد (الأنفلونزا).
- احرص دائمًا على استخدام منديل ورقي أو مرفقك عند السعال أو العطس وليس يدك.
- **اغسل يديك** لمدة 20 ثانية على الأقل أو استخدم معقم يدين يحتوي على الكحول بشكل متكرر، خاصةً بعد السعال أو العطس. اقرأ مصدرنا //نظافة الصحية للأيدي والوقاية من العدو (العنوان)
- <https://sandbox18.mskcc.org/ar/cancer-care/patient-education/hand-hygiene-preventing-infection> للتعرف على كيفية تنظيف يديك بشكل صحيح.
- لا تشارك في استخدام الأغراض مثل الأكواب أو أكواب الشرب أو أواني الأكل أو الألعاب.
- تجنب الاتصال الوثيق مع أي شخص تظهر عليه أعراض البرد أو الأنفلونزا.
- إذا كنت مصاباً بالبرد (الأنفلونزا)، فتجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين حتى تزول أعراض البرد (الأنفلونزا).

توفر أدوية مضادة للفيروسات يمكنك تناولها ويمكن أن تساعد في منع أعراض البرد (الأنفلونزا) أو تقليلها. ويمكن أن يصف لك مقدم الرعاية الصحية هذه الأدوية. ويجب العلم بأن هذه الأدوية لا تحل محل حقنة البرد (الأنفلونزا) التي يجب تلقيها سنويًا.

من أين يمكنني الحصول على حقنة البرد (الأنفلونزا)؟

يمكنك شراء حقنة البرد (الأنفلونزا) من الصيدلية المحلية. تفضل بزيارة

بالقرب منك. إذا كنت مريضاً لدى مركز Memorial Sloan Kettering MSK (الإنفلونزا)، فيمكنك أيضاً الحصول على حقنة البرد (الإنفلونزا) في أحد مواقع MSK. اتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك لتحديد موعد.

متى يجب أن أخذ حقنة البرد (الإنفلونزا)؟

نوصيك بأخذ حقنة البرد (الإنفلونزا) في سبتمبر أو أكتوبر. وذلك هو الوقت المناسب دائماً لأخذ حقنة البرد (الإنفلونزا)، ولكن الحصول عليها في وقت مبكر قدر الإمكان يمكن أن يساعد في حمايتك طوال موسم انتشار البرد (الإنفلونزا).

هل سأصاب بالبرد (الإنفلونزا) من حقنة البرد (الإنفلونزا)؟

لا، حقن البرد (الإنفلونزا) لا تسبب الإصابة بالبرد (الإنفلونزا). تتمثل الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً من حقنة البرد (الإنفلونزا) في التقرح والاحمرار والإيلام والتورم في المنطقة التي أخذت فيها الحقنة.

ماذا يحدث إذا كنت في المستشفى وأصبت بالبرد (الإنفلونزا)؟

إذا كنت مصاباً بالبرد (الإنفلونزا) أثناء وجودك في المستشفى، فستستخدم تدابير الحماية الخاصة لمنع انتشار العدوى.

إذا كنت مصاباً بالبرد (الإنفلونزا) أثناء وجودك في المستشفى:

- سيتم نقلك إلى غرفة خاصة.
- سيتعين على أي شخص يدخل غرفتك غسل يديه بالماء والصابون أو

معقم يدين يحتوي على الكحول قبل الدخول إلى غرفتك وبعد الخروج منها. وسيتم وضع لافتة على باب الغرفة للتذكير بذلك.

- سيتعين على أي شخص يدخل غرفتك ارتداء قناع وثوب أصفر وقفازات أثناء التواجد في غرفتك. وتتوفر هذه الأشياء خارج غرفتك. وسيتم وضع لافتة على باب الغرفة للتذكير بذلك.
- إذا غادرت غرفتك لإجراء الفحوصات، فيجب عليك ارتداء قناع وثوب أصفر وقفازات.
- لن يُسمح لك بالتجول في وحدتك، أو الذهاب إلى الأماكن التالية في المستشفى:
 - المخزن في وحدتك
 - المركز الترفيهي في M15
 - مناطق ترفيه الأطفال في M9 ومركز الرعاية الإسعافية المتنقلة للأطفال (PACC)
 - الكافيتريا
 - البهو الرئيسي
 - أي منطقة عامة أخرى بالمستشفى

يمكنك الحصول على علاج بالفن أو بالتدليل في غرفتك أثناء اتباع تدابير السلامة المذكورة.

يمكنك التوقف عن اتباع إجراءات السلامة هذه عندما لا يمكنك نقل العدوى للآخرين. سيخبرك فريق الرعاية الصحية الخاص بك عندما يكون القيام بذلك آمناً.

أنا مُصاب بالبرد (الأنفلونزا). ماذا علي أن أفعل عندما أذهب إلى مواعيد العيادة الخارجية الخاصة بي؟

- ستحتاج إلى ارتداء قناع على فمك وأنفك طوال موعدك.
- عند تسجيل الوصول لموعدك، سيسألك موظفو الاستقبال عن أعراضك. إذا ظهرت عليك أي أعراض، فسيينقلك أحد أعضاء الفريق إلى غرفة خاصة. وهناك سيوجه لك مقدم الرعاية الصحية المزيد من الأسئلة حول الأعراض لمساعدتك في الحصول على الرعاية التي تحتاجها.
- للحفاظ على سلامة المرضى والموظفين وصحتهم أثناء جائحة COVID-19، قد تغير سياسة الزوار الخاصة بنا أكثر من المعتاد. تفضل بزيارة www.mskcc.org/visit للحصول على أحدث المعلومات.
- إذا كنت تشعر بالغثيان لدرجة لا تسمح لك بالحضور في الموعد المحدد لك، فاتصل بمقدم الرعاية الصحية على الفور لتحديد موعد آخر. يمكنك أيضًا تحديد موعد لزيارة التطبيب عن بعد بدلاً من ذلك. لمزيد من المعلومات حول زيارات التطبيب عن بعد، اقرأ موردنـا زيارات التطبيب عن بعد في مركز ميموريال سلون كيترينج (MSK) (<https://sandbox18.mskcc.org/ar/cancer-care/patient-education/telemedicine-visits-msk>).

أين يمكنني الحصول على مزيد من المعلومات حول البرد (الأنفلونزا)؟

إذا كانت لديك أية أسئلة، فاتصل بمقدم الرعاية الصحية. يمكنك أيضًا زيارة موقع الويب التالي لمزيد من المعلومات:

مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها

www.cdc.gov/flu

وزارة الصحة بولاية نيويورك
www.health.ny.gov/flu

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000

لمزيد من الموارد، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.mskcc.org/pe للبحث في مكتبتنا الإلكترونية.

The Flu (Influenza) - Last updated on December 12, 2022
جميع الحقوق مملوكة ومحفوظة لمركز Memorial Sloan Kettering لعلاج السرطان