



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Lisocabtagene Maraleucel

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Breyanzi

Nombres comerciales: Canadá

Breyanzi

Advertencia

- Este medicamento ha causado un problema de salud grave llamado síndrome de liberación de citocinas (SLC). En algunos casos, esto ha sido potencialmente mortal o mortal. Busque asistencia médica de inmediato si presenta signos como escalofríos; confusión; mareos; latidos rápidos o anormales; dolor de pecho; cambios en la cantidad de la orina; cansancio o debilidad; fiebre; dolor de cabeza; desmayos; sarpullido; hinchazón; problemas para respirar; dolor muscular o articular intenso; piel u ojos amarillos; orina turbia, malestar estomacal intenso, vómitos o diarrea, o sibilancias.
- No tome este medicamento si tiene una infección o cualquier inflamación.
- Se han presentado problemas en el sistema nervioso después del tratamiento con este medicamento. A veces, estos han sido muy graves, han puesto en riesgo la vida o han resultado mortales. Comuníquese con su médico de inmediato si se siente agitado, confundido, nervioso, lento o inquieto. Llame al médico de inmediato si presenta ansiedad, cambios en el equilibrio o la vista, mareos o desmayos, alucinaciones (ver o escuchar cosas que no están presentes), dolores de cabeza, convulsiones, temblores, problemas para hablar, leer o escribir, o cambios nuevos o peores en el comportamiento o estado de ánimo.
- Deberá permanecer cerca del lugar donde obtuvo este medicamento para ver si presenta signos de síndrome de liberación de citocinas (SLC) y problemas del sistema nervioso durante al menos 4 semanas después de recibirlo.
- Es posible que este medicamento aumente el riesgo de padecer otro tipo de cáncer. Esto incluye ciertos tipos de neoplasia hemática. Su médico controlará esto. Consulte con el médico si tiene alguna pregunta.

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Se indica para tratar tipos de leucemia y linfoma.

¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.

Este medicamento puede interactuar con otros medicamentos o trastornos.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Mantenga consigo la tarjeta de seguridad del paciente en todo momento.
- Evite conducir y realizar otras tareas o actividades que requieran un estado de alerta durante al menos 8 horas después de tomar este medicamento. Si tiene preguntas, llame al médico o al farmacéutico.
- Controle sus análisis de sangre y otras pruebas de laboratorio según le haya indicado el médico.
- Este medicamento puede afectar ciertas pruebas de laboratorio. Avise a todos sus proveedores de atención médica y bioquímicos que toma este medicamento.

- Este medicamento puede reducir la capacidad de la médula ósea para producir glóbulos que el cuerpo necesita. Si los recuentos de glóbulos disminuyen demasiado, esto puede provocar problemas de hemorragia, infecciones o anemia. Consulte con el médico si tiene alguna pregunta.
- Es posible que tenga más probabilidades de contraer una infección. Algunas infecciones fueron graves o mortales. Lávese las manos con frecuencia. Manténgase alejado de personas que tengan infecciones, resfríos o gripe.
- Es posible que sangre más fácilmente. Tenga cuidado y evite las heridas. Utilice un cepillo dental suave y afeitadora eléctrica.
- Si tuvo hepatitis B anteriormente o es portador del virus, consulte al médico. Los medicamentos como este pueden hacer que el virus se active nuevamente. Esto puede provocar problemas hepáticos muy graves y, en ocasiones, mortales.
- Se realizarán pruebas de hepatitis y VIH antes de tomar este medicamento.
- Consulte con el médico antes de aplicarse vacunas. Algunos tipos de vacunas no deben administrarse durante al menos 6 semanas antes de comenzar el tratamiento con este medicamento, durante el tratamiento y durante algún tiempo después de su última dosis.
- No done sangre, órganos, tejido ni células. Consulte al médico para saber cuándo puede hacer estas cosas después de tomar este medicamento.
- Este medicamento puede causar daño al feto. Antes de comenzar el tratamiento con este medicamento, se realizará una prueba de embarazo para demostrar que NO está embarazada.
- Es posible que deba utilizar un método anticonceptivo mientras toma este medicamento y durante algo más de tiempo luego de su última dosis. Consulte con el médico para saber si necesita usar un método anticonceptivo.
- Si queda embarazada o cree que puede estar embarazada, llame al médico de inmediato.

- Informe a su médico si está amamantando a su bebé. Tendrá que hablar acerca de si hay riesgos para el bebé.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Los signos de infección incluyen fiebre, escalofríos, dolor de garganta muy grave, dolor de oídos o senos paranasales, tos, aumento del esputo o cambio en el color del esputo, dolor para orinar, aftas o herida que no cicatriza.
- Signos de hemorragia como vomitar o toser sangre, vómito que parece café molido, sangre en la orina, heces negras, rojas o alquitranadas, sangrado de las encías, sangrado vaginal anormal, moretones sin causa o que se agrandan, o sangrado que no puede detener.
- Signos de problemas renales como la incapacidad de orinar, cambios en la cantidad de orina, sangre en la orina o un aumento de peso importante.
- Signos de presión arterial alta o baja como dolores de cabeza o mareos muy graves, desmayos o cambios en la visión.
- Signos de problemas electrolíticos como cambios de humor; confusión; dolor muscular, calambres o espasmos; debilidad; temblores; cambios en el equilibrio; latidos cardíacos anormales; convulsiones; pérdida del

apetito; o malestar estomacal severo o vómitos.

- Signos de un problema de salud grave llamado síndrome de lisis tumoral (TLS) como latidos cardíacos rápidos o anormales, desmayos, problemas al orinar, debilidad muscular o calambres, malestar estomacal, vómitos, diarrea o no poder comer o sentirse perezoso.
- Dolor o presión en el pecho.
- Falta de aire, mucho aumento peso, inflamación en los brazos o piernas.
- Latidos cardíacos anormales o acelerados.
- Problemas para dormir.
- Sensación de mucha somnolencia.
- Incapacidad para concentrarse.
- Problemas o pérdida de la memoria.
- Alucinaciones (ver o escuchar cosas que no están allí).
- Dificultad para caminar.
- Glándula inflamada.
- Inflamación.
- Sensación de ardor, adormecimiento u hormigueo fuera de lo común.
- Inflamación, calor, entumecimiento, cambio de color o dolor en una pierna o un brazo.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Dolor de cabeza.
- Estreñimiento, diarrea, dolor estomacal, malestar estomacal, vómitos o disminución del apetito.

- Cambios en la capacidad de percibir sabores.
- Se siente mareado, cansado o débil.
- Dolor de espalda, huesos, articulaciones, músculos o cuello.
- Espasmo muscular.
- Debilidad muscular.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088. También puede informar sobre los efectos secundarios en <https://www.fda.gov/medwatch>.

¿Cómo se toma mejor este medicamento?

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

- Este medicamento se administra como una infusión en una vena por un periodo de tiempo.
- Se pueden administrar otros medicamentos antes de este para evitar los efectos secundarios.

¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?

- Llame al médico para obtener instrucciones.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

- Si necesita almacenar este medicamento en casa, hable con su médico, enfermera o farmacéutico sobre cómo hacerlo.

Datos generales sobre el medicamento

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Este medicamento viene con una hoja de información adicional para el paciente llamada Guía de medicación. Léala con cuidado. Léala de nuevo cada vez que reponga este medicamento. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de

atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Última fecha de revisión

2024-03-20

Derechos de autor

© 2024 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Lisocabtagene Maraleucel - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center