



חינוך למטופל ולמטפל

מידע אודות ניתוח כריתת שד

מדריך זה יסייע לך להתכונן לניתוח כריתת השד שלך ב-MSK. המדריך גם יסייע לך להבין למה לצפות במהלך ההחלמה מהניתוח.

ניתן להשתמש במדריך זה כמקור מידע לעיון בימים שלפני הניתוח. יש להביא אותו איתך ביום הניתוח. את/ה וצוות הטיפול שלך תעשו שימוש במדריך זה בעת הלמידה על תהליך ההחלמה.

מידע אודות ניתוח כריתת השד

מדריך זה מכיל מידע על מספר סוגים של ניתוחי שד. המנתח ישוחח איתך לגבי הניתוח הספציפי שתעברי. הניתוח שתעברי עשוי להיות:

- כריתת שד מלאה.
- כריתת שד מלאה וביופסיה של בלוטת הזקיף.
- כריתת שד מלאה, ביופסיית בלוטת לימפת זקיף עם אפשרות לדיסקציה של בלוטות הלימפה האקסילריות.
- כריתת שד מלאה ודיסקציה של בלוטות הלימפה האקסילריות (נקרא גם הסרה רדיקלית מתונה של השד).
- ניתוח דומה אחר.

אם את עוברת שחזור שד, המנתח הפלסטי שלך ייתן לך מידע נוסף.

כריתת שד מלאה

כריתת שד מלאה הוא ניתוח להסרת כל רקמת השד. הליך זה נעשה בדרך

כלל דרך חתך כירורגי בחזה, אך ניתן לבצעו בדרכים שונות. מנתח השד שיבצע את הניתוח ישוחח איתך על האופציה המתאימה לך.

יתכן שבמהלך הניתוח שלך יסיר המנתח גם בלוטת לימפה אחת או יותר מבית השחי. פתולוג יבדוק את בלוטות הלימפה כדי לראות אם הסרטן התפשט אליהן.

ביופסיה של בלוטת הזקיף

ביופסיה של בלוטות הזקיף היא הליך שבו בלוטות הלימפה הראשונות בבית השחי שמקבלות ניקוז מהגידול בשד מוסרות ונבדקות לצורך איתור תאים סרטניים. בלוטות לימפה אלו נקראות בלוטות הזקיף. אם מתפשטים תאים סרטניים, בלוטות הזקיף הן בדרך כלל המקום הראשון שאליו הם מגיעים. המנתח יזהה את בלוטות הזקיף על ידי הזרקת צבע מיוחד לשד.

אם את הולכת לעבור ביופסיה של בלוטות הזקיף, ייתכן שתעברי גם הליך מיפוי של מערכת הלימפה כחלק מהניתוח. מידע נוסף על הליך זה כלול בהמשך מדריך זה.

יתכן שהמנתח ישלח את בלוטות הזקיף לפתולוג במהלך הניתוח. אם הפתולוג יבחין בתאים סרטניים כלשהם, המנתח עשוי לבצע דיסקציה של בלוטות לימפה אקסילריות.

דיסקציה של בלוטות הלימפה האקסילריות

דיסקציה של בלוטות הלימפה האקסילריות היא הליך שבו מוסרות רוב או כל בלוטות הלימפה בבית השחי. מספר בלוטות הלימפה שמוסרות משתנה מאדם לאדם.

מידע אודות מערכת הלימפה

הבנת דרך הפעולה של מערכת הלימפה תסייע לך בעת ההכנה לניתוח שד ובמהלך ההתאוששות ממנו. למערכת הלימפה יש 2 תפקידים:

- היא מסייעת להילחם בזיהומים.

- היא מסייעת לנקז נוזלים מאזורים שונים בגוף.

מערכת הלימפה מורכבת מבלוטות לימפה, נימי לימפה ונוזל לימפה (איור 1).

- בלוטות הלימפה הן בלוטות קטנות בצורת שעועית שנמצאות לאורך של נימי הלימפה. בלוטות הלימפה מסננות את נוזל הלימפה בגוף, ובכך מסלקות חיידקים, וירוסים, תאים סרטניים ותוצרי פסולת אחרים.

- נימי הלימפה הם צינורות זעירים, בדומה לכלי הדם שבגוף, הנושאים נוזלים אל בלוטות הלימפה ומחוצה להן.

- נוזל הלימפה הוא הנוזל השקוף שעובר דרך מערכת הלימפה. נוזל זה נושא תאים שמסייעים להילחם בזיהומים ובמחלות אחרות.

יחשה תיבבו דשב הפמילה תכרעמ 1. רויא

איור 1. מערכת הלימפה בשד ובבית השחי

הכנות לניתוח כריתת שד

סעיף זה יסייע לך להתכונן לניתוח. יש לקרוא אותו כאשר נקבע מועד הניתוח. ניתן לעיין בו כאשר מועד הניתוח הולך וקרוב. הוא מכיל מידע חשוב לגבי הדברים שעליך לעשות כדי להתכונן.

תוך כדי קריאת סעיף זה, מומלץ לרשום את השאלות שברצונך לשאול את הרופא שלך.

ההכנות לניתוח

את/ה והצוות המטפל תפעלו יחדיו כדי להתכונן לניתוח. עזור/י לנו לשמור על בטיחותך על ידי כך שתספרי לנו אם אחת מההצהרות הבאות חלות עליך, גם אם אינך בטוח/ה.

• אני נוטל/ת נוגדי קרישה (מדללי דם), כגון:

○ אספירין

○ הפרין

○ ואפארין - (Jantoven®, Coumadin®)

○ קלופידוגרל - (Plavix®)

○ אנוקספרין - (Lovenox®)

○ דביגרטן - (Pradaxa®)

○ אפיקסבן - (Eliquis®)

○ ריברוקסבן - (Xarelto®)

אלו הן דוגמאות לתרופות. ישנן גם אחרות.

יש תמיד לוודא שספקי שירותי הרפואה שלך מודעים לכל התרופות והתוספים שאת/ה נוטל/ת.

• אני נוטל/ת מעכב SGLT2, כגון:

○ קנגליפלוזין (Invokana®)

○ דאפאגליפלוזין (Farxiga®)

○ אמפאגליפלזין (Jardiance®)

○ ארטוגליפלזין (Steglatro®)

- אני נוטל/ת תרופות מרשם, כולל מדבקות ומשחות. תרופת מרשם הינה תרופה שניתן להשיג אך ורק עם מרשם מספק שירותי רפואה.
- אני נוטל/ת תרופות ללא מרשם, כולל מדבקות ומשחות. תרופה ללא מרשם הינה תרופה שניתן לרכוש ללא מרשם.
- אני נוטל/ת תוספי תזונה כלשהם, כגון תוספי צמחים, ויטמינים, מינרלים או תרופות טבעיות או ביתיות.
- יש לי קוצב לב, דפיברילטור מושטל אוטומטי (AICD) או מכשיר אחר הקשור ללב.
- אני סובל/ת מדום נשימה בשינה.
- היו לי בעיות עם הרדמה בעבר. הרדמה הינה תרופה שגורמת לך להיות רדום/ה במהלך ניתוח או הליך.
- יש לי אלרגיה לתרופות מסוימות או לחומרים מסוימים, כולל לטקס.
- אני מוכן/ה לקבל עירו דם.
- אני צורך/ת אלכוהול.
- אני מעשן/ת או משתמש/ת במכשיר עישון אלקטרוני, כגון עט אידוי או סיגריה אלקטרונית.
- אני משתמש/ת בסמים קלים, כגון מריחואנה.

מניעת הריון

אם יש סיכוי שאת עשיה להיכנס להריון לפני הניתוח, הקפידה להשתמש באמצעי מניעה שלא מכילים הורמונים. לדוגמה, ניתן להשתמש בקונדום, דיאפרגמה או התקן תוך רחמי מנחושת (Paragard®).

אם יש לך שאלות לגבי אמצעי מניעה או אם את רוצה עזרה בבחירת סוג אמצעי מניעה שמתאים לך, דברי עם רופא הנשים שלך (גניקולוג).

שימור הפוריות

הימנעי מכניסה להריון במהלך הטיפול. אם הרופא שלך הורה לך להימנע מכניסה להריון למשך זמן מה ואת רוצה להביא ילדים לעולם, אולי כדאי לחשוב על הקפאת ביציות. למידע נוסף, ניתן לקרוא את המאמר *Fertility Preservation Before Cancer Treatment: Options for People Born with Ovaries and a Uterus* (<https://sandbox18.mskcc.org/cancer-care/patient-education/fertility-preservation-females-starting-treatment>).

אודות שתיית אלכוהול

חשוב לשוחח עם הרופא המטפל על כמות האלכוהול שאת/ה שותה. זה יסייע לנו לתכנן את הטיפול בך.

אם את/ה שותה אלכוהול באופן קבוע, את/ה עלול/ה להימצא בסיכון לסיבוכים במהלך הניתוח ולאחריו. סיבוכים אלה כוללים דימומים, זיהומים, בעיות לב ואשפוז ארוך יותר בבית החולים.

אם את/ה שותה אלכוהול באופן קבוע ומפסיק/ה בפתאומיות, זה יכול לגרום לפרכוסים, הזיות ומוות. אם נדע שאת/ה נמצא/ת בסיכון לבעיות אלה, נוכל לרשום תרופות שיסייעו במניעתן.

להלן מספר דברים שניתן לעשות לפני הניתוח כדי למנוע בעיות.

- לנהוג בכנות עם הרופא המטפל לגבי כמות האלכוהול שאת/ה שותה.
- לנסות להפסיק לשתות אלכוהול ברגע שהניתוח נקבע. יש להתקשר לרופא המטפל באופן מיידי אם:

- יש לך כאב ראש.
- את/ה מרגיש/ה בחילה (תחושה שאת/ה עומד/ת להקיא).
- את/ה מרגיש/ה יותר בחרדה (מתוח/ה או מודאג/ת) מהרגיל.
- לא מצליח/ה לישון.

אלו הם סימנים מוקדמים של גמילה מאלכוהול וניתן לטפל בהם.

- ספרי לרופא שלך במידה ואינך יכול/ה להפסיק לשתות.
- שאל/י את ספק שירותי הרפואה שלך שאלות לגבי שתייה וניתוח. כל המידע הרפואי שלך יישמר בפרטיות, כתמיד.

אודות עישון

אם הנך מעשן/ת, ייתכן שיהיו לך בעיות בנשימה בעת ניתוח. הפסקת עישון, אפילו למספר ימים לפני הניתוח, יכולה לסייע.

הרופא יפנה אותך לתוכנית הטיפול שלנו - [Tobacco Treatment Program](#), במידה והנך מעשן/ת. ניתן גם ליצור קשר עם התוכנית בטלפון 212-610-0507.

אודות דום נשימה בשינה

דום נשימה בשינה הינה הפרעת נשימה שכיחה. אם את/ה סובל/ת מדום נשימה בשינה, משמעות הדבר היא שאת/ה מפסיק/ה לנשום לפרקי זמן קצרים בזמן השינה. הסוג הנפוץ ביותר הוא דום נשימה חסימתי בשינה (OSA-obstructive sleep apnea). עם OSA, דרכי הנשימה נחסמות לחלוטין במהלך השינה.

OSA עלול לגרום לבעיות חמורות במהלך הניתוח ולאחריו. ספרי לנו אם יש לך, או אם את/ה חושב/ת שאולי יש לך, דום נשימה בשינה. אם את/ה משתמש/ת במכשיר נשימה, כגון מכשיר CPAP, אנא הבא/י אותו עימך ביום

שימוש בחשבון MyMSK

MyMSK (my.mskcc.org) הוא פורטל המטופלים שלך ב-MSK. באפשרותך להשתמש ב-MyMSK כדי לשלוח ולקבל הודעות מהצוות המטפל, לצפות בתוצאות הבדיקות שלך, לראות את התאריכים ואת שעות הפגישות שלך ועוד. באפשרותך גם להזמין את המטפל שלך ליצור חשבון משלך כדי שיוכל לצפות במידע אודות הטיפול.

אם אין לך חשבון MyMSK, ניתן להירשם באתר my.mskcc.org. ניתן לקבל מספר מזהה להרשמה על ידי התקשרות למספר 646-227-2593, או במשרד הרופא שלך.

How to Enroll in MyMSK: ניתן לצפות ב-
Memorial Sloan Kettering's Patient Portal

(<https://sandbox18.mskcc.org/cancer-care/patient-education/video/how-enroll-mysk-patient-portal>). ניתן גם ליצור קשר עם מוקד התמיכה של MyMSK על ידי שליחת דוא"ל לכתובת mysk@mskcc.org, או התקשרות למספר 800-248-0593.

במהלך 30 הימים לפני ניתוח כריתת השד בדיקות טרום-ניתוח (PST)

תיקבע עבורך פגישת PST לפני הניתוח. תתקבל תזכורת מהמשרד של ספק שירותי הרפואה שלך לגבי תאריך, שעה ומיקום הפגישה. ניתן לבקר בעמוד www.msk.org/parking לצורך קבלת מידע אודות חניה והוראות הגעה לכל המיקומים של MSK.

ניתן לאכול וליטול את התרופות הרגילות שלך ביום של פגישת ה-PST שלך.

רצוי להביא את הפריטים הבאים לפגישה:

- רשימה של כל התרופות שאת/ה נוטל/ת, כולל תרופות מרשם ותרופות ללא מרשם, מדבקות ומשחות.

- תוצאות של בדיקות רפואיות שנעשו מחוץ ל-MSK בשנה שחלפה, במידה ויש לך כאלה. דוגמאות לכך כוללות תוצאות מבדיקת ארגומטריה, בדיקת אקו לב או בדיקת אולטרסאונד דופלר.

- השמות ומספרי הטלפון של הרופאים המטפלים שלך.

תיפגש/י עם ספק רפואה מתקדם (APP) במהלך פגישת ה-PST שלך. ספקים אלה עובדים בצמוד לצוות ההרדמה של MSK. אלה הם רופאים עם הכשרה מיוחדת לשימוש בחומרי הרדמה במהלך ניתוח או הליך רפואי.

ספק הרפואה המתקדם שלך יסקור יחד איתך את ההיסטוריה הרפואית והניתוחית שלך. ייתכן שתעבור/י בדיקות שיסייעו לנו לתכנן את הטיפול בך, כגון:

- אלקטרוקרדיוגרמה (EKG) לבדיקת קצב הלב.

- צילום חזה.

- בדיקות דם.

ייתכן שספק הרפואה המתקדם ימליץ לך לפגוש רופאים אחרים. הוא גם ישוחח איתך על התרופות שעליך ליטול בבוקר הניתוח.

ספרי לאחות המטפלת אם את מניקה או שואבת חלב אם עבור ילדך.

בחירת המטפל שלך

למטפל שלך יש תפקיד חשוב בתהליך הטיפול שלך. לפני הניתוח שלך, את/ה והמטפל שלך תקבלו מידע לגבי הניתוח מספקי שירותי הרפואה שלך. לאחר הניתוח, המטפל שלך יקח אותך הביתה לאחר שחרורך מבית החולים. הוא גם יעזור לך לטפל בעצמך בבית.



הטיפול באדם העובר טיפולים נגד סרטן כרוך באחריות רבה. אננו מציעים משאבי מידע ותמיכה כדי לסייע לך לנהל את תחומי האחריות הללו. לקבלת מידע נוסף, ניתן לקרוא את A

Guide for Caregivers

(<https://sandbox18.mskcc.org/cancer-care/patient-education/guide-caregivers>).

מלא/י טופס ייפוי כוח בריאותי

אם עדיין לא מילאת טופס ייפוי כוח בריאותי, אננו ממליצים למלא טופס זה כעת. אם כבר מילאת טופס שכזה, או אם קיבלת הנחיות רפואיות מקדימות, הבא/י אותם איתך לפגישתך הבאה.

טופס ייפוי כוח בריאותי הינו מסמך משפטי. הוא מזהה את האדם שידבר בשמך במידה ואינך יכול/ה לתקשר בעצמך. אדם זה נקרא סוכן הבריאות שלך.

- לקבלת מידע אודות יפוי כוח בריאותיים והנחיות רפואיות מקדימות אחרות, ניתן לקרוא את *Advance Care Planning for People With Cancer and Their Loved Ones*

(<https://sandbox18.mskcc.org/cancer-care/patient-education/advance-care-planning>).

- לקבלת מידע אודות תפקידך כסוכן בריאות, ניתן לקרוא את *How to Be a Health Care Agent* (<https://sandbox18.mskcc.org/cancer-care/patient-education/how-be-health-care-agent>).

שוחח/י עם חבר בצוות הטיפול שלך אם יש לך שאלות לגבי מילוי טופס שירותי בריאות.

דאג/י לכך שמישהו יסיע אותך חזרה הביתה

עליך לדאוג ששותף אחראי לטיפול ייקח אותך הביתה לאחר הניתוח. שותף אחראי לטיפול הוא אדם שיכול לסייע לך להגיע הביתה בבטחה. על השותף האחראי לדווח על חששות או דאגות כלשהן לצוות המטפל. חשוב לתכנן זאת לפני יום הניתוח.

אם אין לך שותף אחראי לטיפול שייקח אותך הביתה, אנא התקשר/י לאחת מהסוכנויות שלהלן. הם ישלחו מישהו שייסע איתך הביתה. שירות זה כרוך בתשלום, ויהיה עליך לספק את אמצעי התחבורה. ניתן להשתמש במונית או בשירותי הסעות, אבל עדיין צריך שיהיה איתך שותף אחראי לטיפול.

סוכנויות בניו ג'רזי

Caring People: 877-227-4649

סוכנויות בניו יורק

VNS Health: 888-735-8913

Caring People: 877-227-4649

קני תמיסה אנטיספטית כלורהקסידין גלוקונאט 4% (CHG) לניקוי העור (כגון Hibiclens®).

תמיסת CHG 4% הוא חומר ניקוי לעור המחסל חיידקים למשך 24 שעות לאחר השימוש. מקלחת עם תמיסה זו לפני הניתוח תסייע להפחית את הסיכון לזיהום לאחר הניתוח. ניתן לרכוש תמיסה אנטיספטית לניקוי העור 4% (CHG) לפני שתצאי ממרכז השד על שם אוולין ה. לאודר או בבית המרקחת המקומי שלך, ללא מרשם.

קני טבליות אצטמינופן במינון 325 מיליגרם (כגון Tylenol® Regular Strength)

אצטמינופן היא תרופה נגד כאבים ללא מרשם. את תשתמשי בה לאחר הניתוח כדי לסייע בניהול הכאב בבית. רצוי לקנות אותה מבעוד מועד. ניתן לרכוש אותה ללא מרשם בבית המרקחת המקומי. בעת נטילת התרופה, יש להקפיד תמיד למלא אחר ההוראות שעל האריזה או הוראות הרופא

7 ימים לפני ניתוח כריתת השד

עקוב אחר הוראות הרופא בנוגע לנטילת אספירין.

אספירין עלול לגרום לדימום. אם אתה נוטל אספירין או תרופה המכילה אספירין, ייתכן שיהיה עליך לשנות את המינון או להפסיק ליטול אותו 7 ימים לפני הניתוח שלך. יש לעקוב אחר הוראות הרופא. אין להפסיק ליטול אספירין אלא אם כן ניתנה לך הוראה לעשות כן.

למידע נוסף, ניתן לקרוא את *How To Check if a Medicine or Supplement Has Aspirin, Other NSAIDs, Vitamin E, or Fish Oil* (<https://sandbox18.mskcc.org/cancer-care/patient-education/common-medications-containing-aspirin-and-other-nonsteroidal-anti-inflammatory-drugs-nsaids>).

הפסקה של נטילת ויטמין E, מולטי-ויטמינים, תרופות צמחיות ותוספי תזונה אחרים.

ויטמין E, מולטי-ויטמינים, תרופות צמחיות ותוספי תזונה אחרים עלולים לגרום לדימום. יש להפסיק ליטול אותם 7 ימים לפני הניתוח שלך. אם הרופא נותן לך הוראות אחרות, יש לפעול בהתאם להוראות אלה.

למידע נוסף, ניתן לקרוא את *Herbal Remedies and Cancer Treatment* (<https://sandbox18.mskcc.org/cancer-care/patient-education/herbal-remedies-and-treatment>).

יומיים לפני ניתוח כריתת השד

הפסקה של נטילת תרופות אנטי-דלקתיות שאינן כוללות סטרואידים (NSAID)

תרופות נוגדות דלקת לא סטרואידיות (NSAID), כגון איבופרופן (Advil®), (Motrin) ונאפרוקסן (Aleve®), עלולות לגרום לדימום. יש להפסיק ליטול

אותם יומיים לפני הניתוח שלך. אם הרופא נותן לך הוראות אחרות, יש לפעול בהתאם להוראות אלה.

למידע נוסף, ניתן לקרוא את *How To Check if a Medicine or Supplement Has Aspirin, Other NSAIDs, Vitamin E, or Fish Oil* ([https://sandbox18.mskcc.org/cancer-care/patient-education/common-medications-containing-aspirin-and-other-\(nonsteroidal-anti-inflammatory-drugs-nsaids](https://sandbox18.mskcc.org/cancer-care/patient-education/common-medications-containing-aspirin-and-other-(nonsteroidal-anti-inflammatory-drugs-nsaids)

יום אחד לפני ניתוח כריתת השד שים לב למועד הניתוח שלך

איש צוות יתקשר אליך לאחר 14:00 ביום שלפני הניתוח. אם הניתוח מתוכנן ליום שני, הוא יתקשר אליך ביום שישי שלפניו. אם לא תתקבל שיחת טלפון עד השעה 19:00, יש להתקשר למספר 212-639-5014.

איש הצוות יאמר לך באיזו שעה עליך להגיע לבית החולים לצורך ביצוע הניתוח. הוא גם יזכיר לך לאן עליך לפנות.

ניתן לבקר באתר www.msk.org/parking לצורך קבלת מידע אודות חניה והוראות הגעה לכל המיקומים של MSK.

מיפוי מערכת הלימפה

אם את הולכת לעבור ביופסיה של בלוטות הזקיף, ייתכן שתעברי גם הליך מיפוי של מערכת הלימפה ביום שלפני הניתוח או בבוקר יום הניתוח. הליך זה יעזור למנתח שלך למצוא את בלוטות הזקיף במהלך הניתוח עצמו.

במהלך הליך המיפוי של מערכת הלימפה, את תשכבי על כיסא מתכוונן במשך כ-20 דקות. בזמן שתהיי על הכיסא, הרופא יזריק לך כמות קטנה של נוזל רדיואקטיבי מתחת לעור, ממש מתחת לעטרה של השד הפגוע. במהלך ההזרקה, את עלולה להרגיש תחושת צריבה או כוויה.

לאחר ההזרקה, את תעסי את אזור ההזרקה במשך 10 דקות. פעולה זו תסייע לנוזל הרדיואקטיבי להגיע לבלוטות הזקיף. לאחר מכן, הטכנולוג ימדוד את רמת הרדיואקטיביות בשד ובבית השחי בצד הפגוע כדי לראות כמה מהנוזל נספג. ישנן שתי דרכים שבהן ניתן לבצע זאת:

- הטכנולוג עשוי להשתמש במכשיר כף יד קטן הנקרא Neoprobe®.
 - ייתכן שתעברי סריקת הדמיה באמצעות מכונה גדולה יותר שבה יש לשכב. קראי את הסעיף "סריקת רפואה גרעינית" לקבלת מידע נוסף.
- שתי הדרכים אפקטיביות באותה המידה. הרופא שלך יגיד לך למה לצפות.

סריקת רפואה גרעינית

אם את עוברת סריקת הדמיה לאחר ההזרקה, הטכנולוג ייקח אותך לחדר שבו תתבצע הסריקה. את תשכבי על שולחן בזמן שהטכנולוג יצלם תמונות נדרשות 5 דקות להשלים כל תמונה ולכן, במהלך פרק הזמן הזה עליך לשכב בלי לזוז. אם לא נוח לך להישאר בתנוחה כלשהי במשך 5 דקות, בקשי מהטכנולוג לבצע עבורך ספירה לאחור. הסריקה תימשך 10 עד 15 דקות.

התמונות שיצולמו במהלך הסריקה ידגימו את זרימת הנוזל הרדיואקטיבי. הן גם יראו אילו בלוטות לימפה סופגות את הנוזל. הליך זה יוצר "מפה" של מערכת הלימפה שלך. המנתח ישתמש במפה זו כדי למצוא את בלוטות הזקיף שלך במהלך הניתוח.

אם את עוברת ניתוח באותו היום שבו מתבצע מיפוי מערכת הלימפה, איש צוות יעביר אותך מחדר הסריקה לחדר הניתוח. אם הניתוח שלך מתבצע במרכז הכירורגי על שם ג'וזי רוברטסון (JRSC), הצוות המטפל שלך יארגן עבורך הסעה אל JRSC ברכב של MSK לאחר סיום ההליך. ברוב המקרים האחרים, לאחר המיפוי של מערכת הלימפה תשובי הביתה.

יש להתקלח עם תכשיר ניקוי אנטיספטי לעור 4% CHG, כגון Hibiclens

יש להתקלח עם תכשיר ניקוי אנטיספטי לעור 4% CHG בערב שלפני הניתוח, לפני שאת/ה הולך/ת לישון.

1. יש לחפוף את השיער עם השמפו והמרכז הרגילים שלך. חשוב לשטוף את הראש היטב.
 2. יש לשטוף את הפנים ואיזור אברי המין (המפשעה) עם הסבון הרגיל שלך. שטוף את גופך היטב במים חמימים.
 3. פתח את בקבוק תמיסת 4% CHG. שפוך מעט לתוך כפות ידך או על מטלית רחצה נקיה.
 4. התרחק/י מזרם המים במקלחת. שפשף את תמיסת 4% CHG בעדינות על הגוף מהצוואר לרגליים. אין להניח את התמיסה על הפנים או באזור המפשעה.
 5. יש לחזור אל מתחת לזרם המקלחת כדי לשטוף את תמיסת ה-4% CHG. השתמש במים חמימים.
 6. התנגב במגבת נקייה.
- אין למרוח תחליב, קרם, דיאודורנט, מייק אפ, טלק, בושם או אפטר שייב לאחר המקלחת.

הנחיות לאכילה



יש להפסיק לאכול בחצות (12:00 בלילה) בלילה שלפני הניתוח. זה כולל סוכריות קשות ומסטיק.

אם הרופא המטפל הורה לך להפסיק לאכול מוקדם יותר מחצות, יש לעקוב אחר הוראותיו. חלק מהאנשים צריכים לצום (לא לאכול)

למשך פרק זמן ארוך יותר לפני ביצוע הניתוח.

בבוקר ניתוח כריתת השד הנחיות שתיה

בין חצות (12:00 בלילה) ועד לשעתיים לפני מועד הגעתך, עליך לשתות אך ורק את הנוזלים הרשומים ברשימה שלהלן. אין לאכול או לשתות שום דבר אחר. יש להפסיק לשתות שעותיים לפני מועד הגעתך.

- מים.
- מיץ תפוחים צלול, מיץ ענבים צלול או מיץ חמוציות צלול.
- גייטורייד (Gatorade) או פאוארייד (Powerade).
- קפה שחור או תה רגיל. ניתן להוסיף סוכר. אין להוסיף שום דבר אחר.
 - אין להוסיף כל כמות מסוג כלשהו של חלב או שמנת. זה כולל תחליפי חלב או שמנת ממקור צמחי.
 - אין להוסיף דבש.
 - אין להוסיף סירופ בטעמים.

אם את/ה סובל/ת מסוכרת, שים/י לב לכמות הסוכר הנמצאת במשקאות אלה. יהיה לך קל יותר לשלוט ברמות הסוכר בדם אם תצרוך/י את הגרסאות ללא סוכר, מופחתות סוכר או ללא תוספת סוכר של משקאות אלה.

כדאי לשתות כמות מספקת של מים לפני ניתוח, לכן אם את/ה צמא/ה - שתה/י. אין לשתות יותר ממה שאת/ה צריך/ה. במהלך הניתוח תקבל/י נוזלים בעירוי.



יש להפסיק לשתות שתיים לפני מועד הגעתך. זה כולל מים.

עליך ליטול את תרופותיך על פי ההנחיות.

חבר בצוות הטיפול ישוחח איתך על התרופות שעליך ליטול בבוקר הניתוח. עליך ליטול אך ורק את התרופות האלה, עם לגימה של מים. בהתאם לתרופות שאתה נוטל בדרך כלל, אלה יכולות להיות כל תרופות הבוקר הרגילות שלך, חלקן או אף אחת מהן.

יש להתקלח עם תכשיר ניקוי אנטיספטי לעור 4% CHG, כגון Hibiclens

יש להתקלח עם תכשיר ניקוי אנטיספטי לעור 4% CHG (כגון Hibiclens) לפני עזיבתך את בית החולים. השתמש/י בו באותה דרך שבה השתמשת בו בערב הקודם.

אין למרוח תחליב, קרם, דיאודורנט, מייק אפ, טלק, בושם או אפטר שייב לאחר המקלחת.

פרטים שחשוב לזכור

- אם את משתמשת בעדשות מגע, אנא הרכיבי את משקפייך במקומן. הרכבת עדשות מגע בעת ניתוח עלולה לפגוע בעיניך.
- אין לענווד פריטים מתכתיים. יש להסיר את כל התכשיטים, כולל פירסינג בגוף. הציווד בו נעשה שימוש במהלך הניתוח עלול לגרום לכוויות במידה והוא בא במגע עם מתכת.
- דברי ערך יש להשאיר בבית.
- בעת המחזור חודשי (וסת), השתמשי בתחבושת היגיינית ולא בטמפון. תקבלי תחתונים חד פעמיים ותחבושת היגיינית, במידת הצורך.

מה להביא

- חולצה מכופתרת או לא צמודה.
- מכשיר הנשמה לדום נשימה בשינה (כגון מכשיר ה-CPAP), אם יש ברשותך מכשיר שכזה.
- טופס ייפוי כוח רפואי והנחיות מתקדמות אחרות, במידה ומילאת טפסים שכאלה.
- טלפון נייד ומטען.
- סכום כסף שיספיק אך ורק לרכישות קטנות שאולי תרצה/י, כגון עיתון.
- נרתיק לחפצים אישיים, אם יש לך כאלה. דוגמאות לחפצים אישיים: משקפיים, אביזרי שמיעה, שיניים תותבות, פרוטזות, פאות וחפצי דת.
- מדריך זה. במדריך זה ייעשה שימוש בזמן שתלמדי כיצד לטפל בעצמך לאחר הניתוח.

לכשתגיעי לניתוח

אנשי צוות רבים יבקשו ממך לומר ולאיית את שמך ותאריך הלידה שלך. זאת למען בטחונך. ייתכן שמטופלים בעלי אותו שם או שם דומה יעברו ניתוח באותו יום.

כאשר יגיע הזמן להחליף בגדים לקראת הניתוח, יינתנו לך חלוק, כותונת וגרביים נגד החלקה של בית החולים.

פגישה עם האחות

תיערך פגישה עם האחות לפני הניתוח. יש לעדכן את האחות לגבי מינון התרופות שנטלת לאחר חצות (12:00 בלילה) והשעה שבה נטלת אותן. בעדכון יש לכלול תרופות מרשם ותרופות ללא מרשם, מדבקות וקרמים.

יתכן שהאחות תחדיר לך עירווי תוך ורידי (IV), בדרך כלל בורידים ביד או

בזרוע. במידה והאחות לא תחדיר לך עירוי, הוא יוחדר לך על ידי הרופא המרדים שלך בחדר הניתוח.

פגישה עם הרופא המרדים

תיערך פגישה גם עם הרופא המרדים לפני הניתוח. הרופא:

- יבדוק יחד איתך את ההסטוריה הרפואית שלך.
- ישאל האם היו לך בעיות עם הרדמה בעבר. זה כולל בחילה (תחושה שאת/ה עומד/ת להקיא) או כאבים.
- ישוחח איתך אודות נוחות וביטחון בעת הניתוח.
- ישוחח איתך על סוג ההרדמה שאת/ה עומד/ת לקבל.
- יענה על שאלותיך בנושא הרדמה.

סימון אתר הניתוח

יחד עם הבקשה לומר את שמך ותאריך הלידה שלך, אנשי הצוות עשויים לשאול מה שמו של המנתח שלך, איזה ניתוח את עוברת ואיזה צד אמור להיות מנותח. המנתח שלך או חבר אחר בצוות הכירורגי ישתמש בטוש כדי לסמן על גופך את המקום שינותח. זאת למען בטחונך. זה עוזר לוודא שכל חברי הצוות הכירורגי יודעים מהי התוכנית לניתוח שלך.

ההכנה לניתוח

כשיגיע זמן הניתוח, יהיה עליך להסיר משקפיים, עזרי שמיעה, שיניים תותבות, פרוטזות, פאות וחפצי דת.

תוכל/י להיכנס לחדר הניתוח בהליכה או להיות מובל/ת על מיטה על ידי אחד מאנשי הצוות. חבר בצוות חדר הניתוח יסייע לך לעבור למיטת הניתוח. הוא יניח מגפי לחץ על החלק התחתון של רגליך. אלה מתנפחים ומתרוקנים בעדינות כדי לסייע בזרימת הדם ברגליים.

ברגע שתרגיש/י בנוח, הרופא המרדים ייתן לך תרופת הרדמה דרך העירוי ואז תירדם/י. במהלך הניתוח ולאחריו תקבל/י גם נוזלים דרך צינור העירוי.

במהלך הניתוח

לאחר שתירדמי לחלוטין, הצוות המטפל יכניס אל קנה הנשימה שלך, דרך הפה, צינור נשימה כדי לעזור לך לנשום.

אם את עוברת ביופסיה של בלוטת הזקיף, המנתח יזריק כמות קטנה של צבע כחול מתחת לפטמה או ליד הגידול. צבע זה יעבור בנוזל הלימפה אל בלוטות הזקיף, ויצבע אותן בכחול. אם עברת הליך מיפוי של מערכת הלימפה, המנתח ישתמש גם במכשיר קטן שמודד רדיואקטיביות מהנוזל שהוזרק במהלך הליך זה.

לאחר שהמנתח יאתר את בלוטות הזקיף, הוא יבצע חתך ויסיר אותן. ייתכן שהמנתח ישלח אותן למחלקה הפתולוגית במהלך הניתוח כדי לבדוק אם התפשטו אליהן תאים סרטניים. אם הפתולוג יבחין בתאים סרטניים, המנתח עשוי להסיר בלוטות לימפה נוספות. הליך זה נקרא דיסקציה של בלוטות לימפה אקסילריות. במידת הצורך, המנתח שלך ידון אתך בנושא בהרחבה.

מכיוון שנעשה שימוש בצבע כחול במהלך הביופסיה של בלוטות הזקיף, העור, השתן והצואה שלך עשויים להיות בצבע ירוק-כחלחל במשך יום עד יומיים לאחר הניתוח.

בסיום הניתוח, המנתח יסגור את החתך/ים בעזרת תפרים מתחת לעור. יתכן שהמנתח יניח גם Steri-Strips™ (רצועות דקות של אגד רפואי דביק) או Dermabond® (דבק רפואי) מעל החתכים ויכסה אותם בתחבושת.

את צינור הנשימה בדרך כלל מוציאים בזמן שאת עדיין בחדר הניתוח.

התאוששות לאחר ניתוח כריתת שד

סעיף זה יסייע לך לדעת למה לצפות לאחר הניתוח. תלמד כיצד להתאושש בביטחה מהניתוח, הן בבית החולים והן בבית.

תוך כדי קריאת סעיף זה, מומלץ לרשום את השאלות שברצונך לשאול את הרופא שלך.

ביחידה לטיפול לאחר הרדמה (PACU) או בחדר התאוששות

כאשר תתעוררי לאחר הניתוח, את תהיי ב-PACU או בחדר ההתאוששות. האחות תמשיך לעקוב אחרי חום גופך, הדופק, לחץ הדם ורמות החמצן. יתכן שתקבלי חמצן דרך צינור דק המונח מתחת לאף או דרך מסיכה המכסה את האף והפה. בנוסף, את תהיי נעולה במגפי לחץ סביב החלק התחתון של הרגליים.

צינוריות ונקזים

את תהיי לבושה בחזייה כירורגית סביב החזה כדי לכסות את אזור הניתוח שלך, ויחובר לך נקז אחד לפחות מסוג ג'קסון פראט (JP) (ראי איור 2), שיהיה מחובר לחזייה. נקז ה-JP יעזור לנקז את הנוזל מהחתך/ים הכירורגיים ולמנוע נפיחות. את תקבלי אספקת ציוד וחזייה כירורגית נוספת לקחת אתך הביתה כדי לעזור לך לטפל בחתך/ים ובנקז/ים.

איור 2. נקז מסוג ג'קסון פראט (JP)

ניהול הכאב

יהיו לך כאבים לאחר הניתוח. כדי לסייע לך בניהול הכאב:

- את תקבלי תרופות נגד כאבים דרך צינור העירוי.
 - ברגע שתהיי מסוגלת לאכול אוכל רגיל, תקבלי תרופות נגד כאבים דרך הפה (תרופות שבולעים).
- ספקי שירותי הרפואה שלך ישאלו אותך לגבי הכאב לעיתים קרובות ויתנו לך תרופות במידת הצורך. אם לא תהיה לך הקלה בכאב, ספרי על כך לאחד מספקי שירותי הרפואה שלך. חשוב לשלוט בכאב כדי שתוכל/י להשתמש בספירומטר ולהתנייד. שליטה בכאב תאפשר לך להחלים בצורה טובה יותר.

את תקבלי תרופות נגד כאבים לפני שתעזבי את בית החולים. שוחחי עם אחד מספקי שירותי הרפואה שלך לגבי תופעות לוואי אפשריות ומתי ניתן יהיה להתחיל לעבור לתרופות נגד כאבים ללא מרשם.

תנועה והליכה

תנועה והליכה יעזרו להפחית את הסיכון לקרישי דם ודלקת ריאות (זיהום ריאות). רצוי גם להתחיל לשחרר גזים ולוודא יציאות מעיים (צואה) תקינות. חבר בצוות המטפל יעזור לך להתנייד.

לקבלת מידע נוסף לגבי האופן בו הליכה לאחר ניתוח יכולה לסייע לך בהחלמה, ניתן לקרוא את *Frequently Asked Questions About Walking After Your Surgery*

(<https://sandbox18.mskcc.org/cancer-care/patient-education/frequently-asked-questions-about-walking-after-your-surgery>).

קראי את המאמר *Call! Don't Fall!*

(<https://sandbox18.mskcc.org/cancer-care/patient-education/call-dont-fall>) כדי ללמוד מה ביכולתך לעשות כדי לשמור על בטיחותך ולמנוע נפילות בזמן שהותך בבית החולים.

אמן/י את ריאותיך

חשוב להפעיל את הריאות כך שיוכלו להתרחב באופן מלא. פעולה זו עשויה למנוע היווצרות של דלקת ריאות.

- עשה/י שימוש בספירומטר ממריץ 10 פעמים בכל שעה מהשעות בהן את/ה ער/ה. לקבלת מידע נוסף, ניתן לקרוא את *How To Use Your Incentive Spirometer* (<https://sandbox18.mskcc.org/cancer-care/patient-education/how-use-your-incentive-spirometer>).
- תרגל שיעול ונשימה עמוקה. חבר מהצוות המטפל ינחה אותך כיצד לעשות זאת.

שתיה ואכילה

בהתחלה, תוכלי לשתות מים או מיץ. בהמשך, תוכלי להתחיל לאכול מזון מוצק, כגון קרקרים. לאחר מכן, תוכלי לחזור לתזונה הרגילה שלך לפי היכולת שלך. אם יש לך שאלות בנושאי תזונה, בקשי לפגוש תזונאית דיאטנית קלינית.

למדי לטפל בצינורות ובנקזים

את תחזרי הביתה עם נקז JP אחד לפחות. הנקז/ים יוסרו בדרך כלל כשבועיים לאחר הניתוח, אך ייתכן שיישארו זמן רב יותר.

אחת האחיות תלמד אותך כיצד לטפל בנקז/ים לפני השחרור מבית החולים. מומלץ שגם האדם שיטפל בך בבית ילמד לעשות זאת. זה יקל עליו לעזור לך בבית.

למידע נוסף, קראי את המאמר *Caring for Your Jackson-Pratt Drain*

(<https://sandbox18.mskcc.org/cancer-care/patient-education/caring-your-jackson-pratt-drain>).

תכנני את השחרור מבית החולים

הפגישה הראשונה שלך לאחר הניתוח תהיה בדרך כלל בתוך שבוע עד שבועיים לאחר עזיבת בית החולים. האחות תיתן לך הנחיות כיצד לקבוע תור עבור פגישה זו, כולל מספר הטלפון שאליו יש להתקשר.

השחרור מבית החולים

לפני עזיבתך את בית החולים, כדאי לבחון את החתכים הכירורגיים יחד עם אחד מספקי שירותי הרפואה שלך. אם תדעי כיצד הם נראים, זה יעזור לך להבחין בשינויים מאוחר יותר.

לפני שתעזבי, הרופא שלך יכתוב את הוראות השחרור ואת מרשמי התרופות שלך. תקבלי גם העתק כתוב של הנחיות שחרור. אחד מספקי שירותי הרפואה שלך יעבור עליהן אתך לפני שתעזבי את בית החולים. יהיה עליך לדאוג לכך ששותף אחראי לטיפול ייקח אותך הביתה.

בבית

קראי את מה אפשר לעשות כדי להימנע מנפילה

(<https://sandbox18.mskcc.org/he/cancer-care/patient-education/what-you-can-do-avoid-falling>) כדי ללמוד מה ביכולתך לעשות כדי למנוע נפילות בזמן שהותך בבית ובעת ביקוריך ב-MSK.

מילוי טופס המעקב אחר ההתאוששות

ברצוננו לדעת כיצד אתה מרגיש לאחר עזיבתך את בית החולים. כדי לסייע לנו בטיפול בך, אנו נשלח שאלות לחשבון MyMSK שלך. אנו נשלח אותן בכל יום למשך 10 ימים לאחר עזיבתך את בית החולים. שאלות אלה נקראות טופס מעקב אחר התאוששות.

עליך למלא את טופס מעקב ההחלמה מידי יום לפני חצות (12:00 בלילה).
מילוי הטופס אורך רק 2-3 דקות. תשובותיך לשאלות אלה יסייעו לנו להבין
מה אתה מרגיש ולמה אתה זקוק.

בהתבסס על תשובותיך, אנו עשויים לפנות אליך לקבלת מידע נוסף. מעת
לעת, ייתכן שנבקש ממך להתקשר למשרד הרופא המנתח. באפשרותך
תמיד להתקשר למשרד הרופא המנתח במידה ויש לך שאלות.

למידע נוסף, קרא את *Common Questions About MSK's Recovery Tracker* (<https://sandbox18.mskcc.org/cancer-care/patient-education/mymsk-recovery-tracker>).

ניהול הכאב

אנשים חווים כאב או חוסר נוחות למשך פרקי זמן משתנים. ייתכן שעדיין
תסבלי מכאב כלשהו בעת חזרתך הביתה וכנראה שתיטלי תרופות נגד
כאבים. לחלק מהאנשים יש כאב, לחץ או כאבי שרירים סביב החתכים
הכירורגיים במשך 6 חודשים או יותר. אין פירוש הדבר שמשהו אינו תקין.

יש לעקוב אחר ההנחיות להלן כדי לסייע בניהול הכאב בבית.

- עליך ליטול את תרופותיך לפי ההנחיות ועל פי הצורך.
- יש ליצור קשר עם הרופא המטפל במידה והתרופות שנרשמו אינן
מקלות על הכאב.
- אין לנהוג או לשתות אלכוהול בעת נטילת תרופות מרשם לכאב. תרופות
מרשם מסויימות להפגת כאב עלולות לגרום לישנוניות (נמנום). אלכוהול
עשוי להחמיר את הנמנום.
- ככל שהחתך מחלים, כך יפחתו גם הכאב וגם ההזדקקות לתרופות
להפגת כאב. משכך כאבים ללא מרשם יוכל לסייע במקרה של כאבים

ואי נוחות. אצטמינופן (Tylenol®) ואיבופרופן (Advil או Motrin) הינם דוגמאות לתרופות לשיכוך כאבים ללא מרשם.

- יש לעקוב אחר הוראות הרופא בנוגע להפסקה של נטילת התרופות במרשם להפגת כאב.
- אין להגזים בנטילת תרופה מכל סוג שהוא. יש לפעול על פי ההוראות שעל תווית התרופות או על פי הוראות הרופא המטפל.
- יש לקרוא את התוויות על גבי כל התרופות שאת/ה נוטל/ת. הדבר חשוב במיוחד במקרה של נטילת אצטמינופן. אצטמינופן הוא מרכיב נפוץ בתרופות ללא מרשם רופא. נטילה מוגזמת עלולה לפגוע בכבד. אין ליטול יותר מתרופה אחת המכילה אצטמינופן מבלי לשוחח עם חבר בצוות המטפל.
- תרופות להפגת כאב אמורות לסייע לך לחזור לפעילות רגילה. יש ליטול כמות מספיקה של תרופות שיאפשרו לך לבצע את הפעילויות או התרגילים שלך בנוחות. יתכן שהכאב יתגבר מעט ברגע שתתחיל/י להיות פעיל/ה יותר.
- יש לעקוב אחר זמני נטילת התרופות להפגת כאב. הן פועלות בצורה הטובה ביותר 30-45 דקות לאחר נטילתן. נטילת התרופות כשהכאב רק מתחיל עדיפה מאשר להמתין שהכאב יחמיר.
- תרופות מסויימות נגד כאבים (כגון אופיואידים) עלולות לגרום לעצירות (כלומר, פחות תנועות מעיים מהרגיל).

מניעת עצירות וניהולה

שוחח/י עם הרופא לגבי הדרכים למניעת עצירות ולניהולה. ניתן גם לעקוב אחרי ההנחיות שלהלן.

- השתדל/י ללכת לשירותים בכל יום באותו זמן. גופך יתרגל ללכת בזמן

הזה. אך אם את/ה מרגיש/ה דחף להתפנות, אל תדחה/י זאת.

- נסה/י להשתמש בשירותים 5 עד 15 דקות לאחר הארוחות. זמן טוב להתפנות הוא אחרי ארוחת הבוקר. זה הזמן בו הרפלקסים במעי הגס הם החזקים ביותר.
- בצע/י פעילות גופנית, במידה ואת/ה יכול. הליכה הינה דוגמה לפעילות נהדרת שיכולה למנוע עצירות ולנהל אותה.
- יש לשתות 8 עד 10 כוסות של 8 אונקיות (2 ליטר) של נוזלים ביום, אם הדבר אפשרי עבורך. בחר/י לשתות מים, מיצים (כגון מיץ שזיפים מיובשים), מרקים ומילקשייקים. הגבל/י צריכת נוזלים המכילים קפאין, כגון קפה ומשקאות תוססים. קפאין עלול להוציא נוזלים מהגוף.
- הגבר/י בהדרגה את כמות הסיבים בתזונה ל-25 עד 35 גרם ליום. פירות וירקות בקליפתם, דגנים מלאים ודגני בוקר מכילים סיבים. אם יש לך אוסטומיה או שעברת ניתוח מעיים לאחרונה, שוחח/י עם הרופא לפני ביצוע שינויים בתזונה.
- קיימות גם תרופות ללא מרשם וגם תרופות במרשם לטיפול בעצירות. יש להתייעץ עם ספק שירותי הרפואה לפני השימוש בתרופות למניעת עצירות. זה חשוב ביותר, במיוחד אם עברת אוסטומיה או ניתוח מעיים. יש לפעול על פי ההוראות שעל תווית התרופות או על פי הוראות הרופא המטפל. דוגמאות לתרופות ללא מרשם לעצירות כוללות:
 - נטרן דוקוסאט (Colace®). זהו מרכך צואה (תרופה שמרככת את יציאות המעיים שלך) הגורם לתופעות לוואי מעטות. ניתן להשתמש בו כדי למנוע עצירות. אין ליטול את התרופה עם שמן מינרלי.
 - פוליאטילן גליקול (MiraLAX®). זהו חומר משלשל (תרופה שגורמת לתנועת מעיים) הגורם לתופעות לוואי מעטות. יש ליטול אותו עם 8 אונקיות (כוס אחת) של נוזל. יש ליטול אותו אך ורק במידה שכבר יש

לך עצירות.

○ סנה (Senokot®) (Senna). זהו חומר משלשל ממריץ, שעלול לגרום להתכווצויות. מומלץ ביותר ליטול אותו לפני השינה. יש ליטול אותו אך ורק במידה שכבר יש לך עצירות.

אם כל אחת מתרופות אלה גורמת לשלשולים (יציאות מעיים רכות או מימיות), יש להפסיק ליטול אותה. ניתן לשוב וליטול אותן במידת הצורך.

אם לא היו לך יציאות מעיים במשך יומיים, התקשרי לרופא שלך.

תהליך הריפוי ותחושות חדשות

במהלך ההחלמה מהניתוח, את עשויה להרגיש הרבה תחושות שונות בזרוע, בחזה או בדופן החזה. יתכן שתחושי רגישות, חוסר תחושה, עקצוץ או את שלושתן יחד. יתכן שתהיה לך תחושה כאילו נוזל יורד במורד הזרוע שלך כאשר אין באמת נוזל ממשי. זה יכול לקרות מכיוון שהעצבים שלך נחתכו במהלך הניתוח.

לאחר כריתת השד, את עשויה גם להרגיש שהשד או הפטמה שלך עדיין נוכחים. תחושה זו נקראת תחושת פנטום.

תחושות אלו בדרך כלל באות והולכות ולעתים קרובות משתפרות במהלך החודשים הראשונים לאחר הניתוח. תחושות מסוימות עשויות להימשך חודשים, או אפילו 5 שנים או יותר. הסיבה לכך היא שהעצבים הם החלק בגוף שמחלים הכי לאט. רוב האנשים מדווחים שהתחושות אינן קשות או מטרידות.

בגלל השינוי בתחושה, אין להניח שום דבר חם או קר (כגון בקבוקי מים חמים, כריות חימום או שקיות קרח) ישירות על אזור הניתוח.

עם התקדמות ההחלמה, את עשויה להרגיש רקמת צלקת לאורך אזורי

החתך שלך. היא תהיה קשה למגע. זה נפוץ, והיא תתרכך במהלך החודשים הקרובים.

הטיפול בחתכים הכירורגיים

החתכים שלך ייסגרו עם תפרים מתחת לעור. תפרים אלו מתמוססים מעצמם, ולכן אין צורך להסירם. אם נשארו פיסות קטנות של אגד רפואי (Steri-Strips) מעל החתכים, המנתח או האחיות יסירו אותם בפגישת המעקב שלך. אם יש שאריות של דבק רפואי (Dermabond) על החתכים, הן יתמוססו מעצמן עם הזמן.

יש להקפיד לעקוב אחר הוראות הרופא המטפל שלך לגבי תדירות הניקוי של החתכים.

כשבוע או שבועיים לאחר הניתוח, עלול להיווצר כיס נוזלים מתחת לעור בית השחי או אזור החזה שממנו הוסרה הרקמה. כיס זה נקרא סרומה, והוא לא מזיק. האזור עשוי להיות רך ונפוח. הוא עלול גם להיות רגיש לכאב.

סרומות בדרך כלל נעלמות מעצמן. אם את מפתחת סרומה גדולה או כזו שגורמת לך לאי נוחות, התקשרי אל משרד ספק שירותי הרפואה כדי לשוחח עם הרופא או עם האחיות.

יש ליצור קשר עם הרופא המטפל במקרה ש:

- העור סביב החתך אדום מאוד.
- העור סביב החתך נעשה אדום יותר.
- את רואה הפרשה שנראית כמו מוגלה (סמיכה וחלבית).

שתיה ואכילה

ניתן לאכול את כל המאכלים שאכלת לפני הניתוח, אלא אם קיבלת הנחיות אחרות מהרופא. אכילת תזונה מאוזנת עשירה בקלוריות וחלבון תסייע

בהחלמה לאחר הניתוח. מומלץ לאכול מקור חלבון בריא (כגון בשר, דגים או ביצים) בכל ארוחה. מומלץ לאכול גם פירות, ירקות ודגנים מלאים.

חשוב לשתות כמות רבה של נוזלים. יש לשתות נוזלים שלא מכילים אלכוהול או קפאין. נסי לשתות 8 עד 10 כוסות (של 8 אונקיות) של נוזלים בכל יום.

אם יש לך שאלות בנושאי תזונה, בקשי לפגוש תזונאית דיאטנית קלינית.

מקלחת

אם עברת שחזור שד, שוחחי עם המנתח הפלסטי שלך לגבי מתי תוכלי להתקלח ואם יש הנחיות מיוחדות. אם לא עברת שחזור, תוכלי להתקלח 24 שעות לאחר הניתוח. לפני שתלכי הביתה, האחות תלמד אותך איך לאבטח את הנקז בזמן המקלחת.

כשתהיי מוכנה להתקלח, הסירי את החזייה הניתוחית שלך ואת כל רפידות הגזה המכסות את החתך/ים. אם יש לך רצועות אגד רפואי Steri-Strips על החתכים, אל תסירי אותן.

שטפי בעדינות את החתכים במים וסבון, תני למי המקלחת לזרום עליהם.

לאחר המקלחת, יבשי את החתכים בעזרת מגבת נקייה. לבשי חזרה את החזייה הכירורגית והצמידי את הנקזים לחזייה. אם יותר נוח לך, את יכולה להניח פד גזה נקי מעל החתכים, מתחת לחזייה.

הימנעי מאמבטיות, טבילה בג'קוזי, סאונות ובריכות שחייה עד שהרופא המטפל יגיד לך שזה בסדר. כמו כן, דברי עם הרופא המטפל לפני כל שימוש בדאודורנט, קרם, אבקה או בושם בכל מקום ליד אזור הניתוח.

לבישת חזייה

אם יש לך חזייה כירורגית, המשיכי ללבוש אותה עד להסרת הנקזים. לאחר

מכן, דברי עם הרופא לגבי מה ללבוש. החזייה הכירורגית שלך תספק תמיכה, תעזור לך לשמור על נוחות ותחזיק את הנקזים במקום. עליך ללבוש את החזייה הכירורגית גם בזמן השינה, אך להוריד אותה לפני המקלחת.

בזמן שאת מחלימה מהניתוח או עוברת את השלבים השונים של שחזור השד, ניתן לרפד את החזייה שלך כדי לסייע באיזון המראה החיצוני שלך. אחת הדרכים למילוי החזייה היא להשתמש בתותב שד זמני. תותב השד הזמני הוא נרתיק ניילון קל משקל. ניתן להתאים את גודל הנרתיק כך שיתאים לשד השני שלך על ידי הוספה או הוצאת מוך הכותנה שבתוכו. ניתן לכבס את נרתיק הניילון עם סבון עדין כגון Woolite® או Ivory®, ואז להניח לו להתייבש באוויר.

ישנן חנויות מיוחדות המוכרות סוגים רבים של תותבי שד וחזיות. אפשר לקנות מוצרים אלה מאתרי אינטרנט ללא תלות במקום המגורים שלך. ניתן לרכוש אותם גם בבוטיקים מקומיים שמתמחים באביזרים לאחר ניתוח כריתת שד ובחנויות הלבשה תחתונה. לרשימה של חנויות מקוונות וחנויות באזור שלך, קראי את *Resources, Clothing, and Support After Breast Reconstruction Surgery* (<https://sandbox18.mskcc.org/cancer-care/patient-education/resources-clothing-support-breast-reconstruction>).

את יכולה גם לרפד את החזייה בעזרת גזה רכה, שתוכלי לקבל מהאחות. החליפי את הגזה לעתים קרובות כדי לוודא שהיא תמיד נקייה.

תותבי שד

תותב שד היא צורת שד קבועה יותר מאשר נרתיק הניילון הרך. אם את מעוניינת להרכיב תותב שד, דברי עם הרופא שלך. אם לא עברת שחזור שד, בדרך כלל אפשר להתחיל להרכיב את התותב כ-4 עד 6 שבועות לאחר

הרופא שלך יכול לתת לך מרשם לתותב שד במהלך פגישת המעקב. בדקי עם חברת הביטוח שלך כדי לברר מה מכסה הפוליסה שלך מבחינת תותבי שד.

ישנן חנויות מיוחדות המוכרות סוגים רבים של תותבי שד וחזיות. אפשר לקנות מוצרים אלה מאתרי אינטרנט ללא תלות במקום המגורים שלך. ניתן לרכוש אותם גם בבוטיקים מקומיים שמתמחים באביזרים לאחר ניתוח כריתת שד ובחנויות הלבשה תחתונה. לרשימה של חנויות מקוונות וחנויות באזור שלך, קראי את *Resources, Clothing, and Support After Breast Reconstruction Surgery* (<https://sandbox18.mskcc.org/cancer-care/patient-education/resources-clothing-support-breast-reconstruction>).

פעילות גופנית וכושר

אם עברת שחזור, אל תרימי חפצים שמשקלם כבד מ-5 פאונד (2.3 קילוגרם) עד שהרופא שלך יאמר לך שזה בטוח. זה בדרך כלל לוקח בערך 4 עד 6 שבועות. כמו כן, הימנעי מפעילויות מאומצות (כגון ריצה וטניס) ומספורט מגע (כגון כדורגל) במהלך תקופה זו.

חבר בצוות המטפל שלך ייתן לך הנחיות כתובות לגבי התרגילים והתנועות שמותר לך לעשות בזמן שהחתכים שלך מחלימים. תוכלי גם למצוא רשימה של תרגילים במשאב המידע *Exercises After Your Mastectomy or Breast Reconstruction* (<https://sandbox18.mskcc.org/cancer-care/patient-education/exercises-after-mastectomy-or-breast-reconstruction>).

רקמת הצלקת שנוצרת סביב אסור הניתוח שלך יכולה להגביל את טווח

התנועה של הזרוע והכתף. אם עברת שחזור, ייתכן שתחוו גם כאבי שרירים או מתח. אם את סובלת מאי נוחות, נטילת תרופות נגד כאבים 30 דקות לפני תחילת התרגילים יכולה לעזור.

סביר שתהיה לך פחות אנרגיה מהרגיל לאחר הניתוח. זמן ההחלמה שונה עבור כל אחת. הגבירי את רמת הפעילות מידי יום במידת האפשר. חשוב תמיד לשמור על איזון בין פרקי זמן של פעילות ומנוחה. פעילות גופנית אירובית, כגון הליכה וטיפוס במדרגות תעזור לך לצבור כוח ולהרגיש טוב יותר.

פעילות מינית

את יכול לחזור לפעילות מינית כאשר תרגישי שאת מוכנה. קיום יחסי מין לא יפגע באזור הניתוח שלך.

זה יכול לעזור לתת לבן הזוג לראות את החתכים שלך זמן קצר לאחר הניתוח. זה עשוי להקל על כל הדאגות שיש לשניכם. שתפי את בן הזוג שלך במה נוח לך ומה לא. הימנעי מהפעלת לחץ על אזור הניתוח בשבועות הראשונים לאחר הניתוח. נסי להניח כרית קטנה או מגבת על אזור הניתוח. אם יש לך שאלות, דברי עם האחות.

ייתכן שיש לך חששות לגבי ההשפעות של הסרטן והטיפול על איך שאת נראית או על המיניות שלך. [התוכנית לרפואה מינית לנשים ובריאות האישה](#) זמינה כדי לעזור לך. למידע נוסף, התקשרי למספר 646-888-5076.

אם יש סיכוי שאת יכולה להיכנס להריון, הקפידי להשתמש באמצעי מניעה. אל תשתמשי בשום צורה של אמצעי מניעה הורמונליים. אמצעי מניעת ההריון האפשריים עבורך הם:

• קונדומים לגבר

- דיאפרגמה

- התקן נחושת תוך-רחמי בצורת T. אם את מעוניינת בשיטה זו, דברי עם רופא הנשים שלך. סוג זה של התקן תוך-רחמי יכול להישאר למשך 10 שנים וניתן להסירו מוקדם יותר.

המשיכי להשתמש באמצעי מניעה במהלך הטיפול ועד שהרופא יאמר לך שבטוח עבורך לנסות להיכנס להריון.

נהיגה

רוב הנשים יכולות להתחיל לנהוג שוב תוך 6 שבועות לאחר הניתוח. אל תנהגי בזמן שאת נוטלת תרופות מרשם נגד כאבים. תרופות אלה עלולות לגרום לנמנום, ונהיגה במצב זה אינה בטוחה עבורך. ניתן לנסוע במכונית כנוסע בכל זמן לאחר השחרור מבית החולים.

כמו כן, אל תנהגי עד ש:

- הנקזים יוסרו.
- חזרת אל מלוא טווח התנועה שלך.
- תוכלי לסובב בנוחות את גלגל ההגה.

אם יש לך שאלות לגבי מתי בטוח עבורך לנהוג, דברי עם הרופא שלך.

חזרה לעבודה

שוחח/י עם ספק שירותי הרפואה שלך לגבי עבודתך. הוא יאמר לך מתי יהיה הזמן הבטוח עבורך לחזור לעבודה, בהתבסס על סוג העבודה שלך. אם עבודתך דורשת ממך להסתובב ממקום למקום או להרים חפצים כבדים, יתכן שיהיה עליך להמתין עם חזרתך לזמן מה. אם עבודתך מתנהלת במשרד, יתכן שתוכל/י לשוב לעבודתך מוקדם יותר.

מידע אודות בצקת לימפטית

לפעמים, הסרת בלוטות הלימפה עלולה להקשות על מערכת הלימפה שלך לבצע כראוי את פעולת הניקוז. אם זה קורה, עלול להצטבר נוזל לימפה באזור שבו הוסרו בלוטות הלימפה. הנוזל הנוסף הזה גורם לנפיחות הנקראת בצקת לימפטית (לימפדמה).

בצקת לימפטית יכולה להתפתח בזרוע, ביד, בשד או בפלג הגוף העליון בצד הנגוע (הצד שממנו הוסרו בלוטות הלימפה).

רוב האנשים לא מפתחים בצקת לימפטית, אבל יש כאלה שכן. קשה לדעת מהו הסיכון של אדם לפתח בצקת לימפטית מכיוון ש:

- אין בדיקה סטנדרטית לאבחון בצקת לימפטית.
- הסרה או פציעה של בלוטות הלימפה משפיעה על אנשים בצורה שונה.
- בצקת לימפטית יכולה להתפתח זמן קצר לאחר הניתוח, אך היא יכולה גם להתפתח שנים מאוחר יותר.
- מקרים נוכחיים של בצקת לימפטית יכולים להיגרם על ידי שיטות טיפול ישנות יותר.

הסיכון שלך לפתח בצקת לימפטית תלוי באופן הסרת בלוטות הלימפה שלך (ראי איור 3).

במהלך ביופסיה של בלוטות הזקיף, מוסרות בין אחת לכמה בלוטות לימפה מבית השחי שלך ונבדקות כדי לקבוע אם קיימים בהן תאים סרטניים. הסיכון לפתח בצקת לימפטית לאחר ביופסיה של בלוטות הזקיף הוא נמוך. בערך 0 עד 7 מכל 100 אנשים שעוברים ביופסיה של בלוטות הזקיף מפתחים בצקת לימפטית.

במהלך דיסקציה של בלוטות לימפה אקסילריות, מוסרות יותר בלוטות לימפה מבית השחי. הליך זה מבוצע כדי להסיר בלוטות לימפה נוספות

שעשויות להכיל תאים סרטניים. הסיכון לפתח בצקת לימפטית לאחר דיסקציה של בלוטות לימפה אקסילריות גבוה יותר מאשר לאחר ביצוע ביופסיה של בלוטות הזקיף. כ-15 עד 25 מתוך כל 100 אנשים שעוברים דיסקציה של בלוטות לימפה אקסילריות עלולים לפתח בצקת לימפטית. אין דרך לדעת בוודאות מי יפתח בצקת לימפטית.

איור 3. סיכון משוער להתפתחות בצקת לימפטית

הפחתת הסיכון לפתח בצקת לימפטית

הקפדה על הדברים הבאים עשויה לסייע לך

בהפחתת הסיכון לפתח בצקת לימפטית.

- שמירה על משקל גוף בריא, או ביצוע פעולה לצורך הגעה למשקל תקין בדרך בטוחה.
- אימון ומתיחת השרירים באופן קבוע וסדיר. שוחחי עם המנתח או האחות לגבי התרגילים שיתאימו לך בצורה הטובה ביותר.
 - כאשר את חוזרת להתאמן וחוזרת לפעילות, בצעי זאת לאט ובהדרגה. אם את מרגישה אי נוחות, עצרי וקחי הפסקה. פעילות גופנית לא אמורה לגרום לכאב.
- נסי למזער את הסיכון לזיהום ביד ובזרוע. שאלי את הרופא כיצד לטפל בצורה הטובה ביותר בחתכים, שריטות וכוויות.

אם עברת ביופסיה של בלוטת הזקיף:

- ניתן להשתמש בזרוע הבלתי מושפעת לצורך לקיחת דם, זריקות, אינפוזיה תוך ורידית ומדידות לחץ דם. בקשי מספק שירותי הרפואה

שלך לנסות להשתמש בזרוע שלא הושפעה, אם ניתן.

- אם את מתחילה להבחין בסימנים כלשהם של בצקת לימפטית, השתמשי תמיד בזרוע שלא הושפעה. אם זה לא מתאפשר, שוחחי עם הרופא שלך כדי לקבוע איזו זרוע היא הכי בטוחה לשימוש.

אם עברת דיסקציה של בלוטות לימפה אקסילריות:

- קראי את המסמך הנחיות טיפול ביד ובזרוע לאחר כריתת בלוטות לימפה בבית השחי (<https://sandbox18.mskcc.org/he/cancer-care/patient-education/hand-and-arm-care-after-removal-axillary-lymph-nodes>) לקבלת מידע על הפחתת הסיכון לבצקת לימפטית לאחר ההליך.

סימנים של בצקת לימפטית

נפיחות קלה מסוימת לאחר הניתוח היא נורמלית. הנפיחות עשויה להימשך עד 6 שבועות. לעתים קרובות הנפיחות היא זמנית ותחלוף בהדרגה. לאחר הניתוח, את עלולה גם להרגיש כאב או תחושות אחרות כגון צביטות ועקצוצים. תחושות אלה שכיחות ואינן בהכרח סימנים לבצקת לימפטית.

אם את בסיכון לפתח בצקת לימפטית, שימי לב לסימנים הבאים בזרוע, ביד, בשד ובפלג הגוף העליון שהושפעו מההליך:

- תחושת כובד או כאב
- תחושה מתח בעור
- גמישות מופחתת
- שינויים בעור, כגון מתיחות או שקעים (עור שנשאר שקוע לאחר הלחיצה עליו)

אם יש לך סימנים כלשהם לבצקת לימפטית או שאת לא בטוחה, יש לפנות

לספק שירותי הרפואה שלך.

ניהול הרגשות שלך

ייתכן שתחושה/י רגשות לא נעימים שלא חווית בעבר לאחר ניתוח שבוצע עקב מחלה קשה. אנשים רבים מדווחים שחשו בנטיה לבכי, עצובים, מודאגים, חרדים, עצבניים וכועסים בזמן כזה או אחר. את/ה עשוי/ה לגלות שאין ביכולתך לשלוט בחלק מרגשות אלה. במידה וכך קורה, מומלץ לחפש תמיכה רגשית. ספק שירותי הרפואה שלך יכול להפנות אותך למרכז היעוץ של MSK. ניתן להשיג את מרכז היעוץ גם בטלפון שמספרו 646-888-0200.

הצעד הראשון בהתמודדות הוא לדבר על תחושותיך. משפחה וחברים יכולים לסייע במצבים כאלה. גם אנחנו יכולים להרגיע, לתמוך בך ולהדריך אותך. תמיד מומלץ לדווח לנו כיצד את/ה, בני משפחתך וחבריך מרגישים מבחינה רגשית. משאבים רבים עומדים לרשותך ולרשות בני משפחתך. אנחנו כאן כדי לסייע לך ולבני משפחתך וחבריך להתמודד עם ההיבטים הרגשיים של מחלתך. ביכולתנו לסייע בין אם את/ה נמצא/ת בבית החולים או בביתך.

מתי יש ליצור קשר עם הרופא המטפל

יש ליצור קשר עם הרופא המטפל במקרה ש:

- את סובלת מחום של 38 מעלות צלזיוס (100.4 מעלות פרנהייט) או גבוה יותר.
- יש התנקזות של נוזלים מהחתכים הכירורגיים.
- יש לך קשיים בנשימה.
- העור שמסביב לחתך חם לתחושה יותר מהרגיל.
- את חווה אי נוחות מוגברת באזור החתכים.

- העור שמסביב לחתכים אדום יותר מהרגיל.
- האזור שמסביב לחתכים מתחיל להתנפח.
- הנפיחות מסביב לחתכים מחמירה.
- אם יש לך שאלות או חששות.

פרטי יצירת קשר

בימים שני עד שישי בין השעות 9:00 ל-17:00 ניתן להתקשר למשרד ספק שירותי הרפואה.

אחרי השעה 17:00 בערב, במהלך סוף השבוע ובזמן חופשות, ניתן להתקשר לטלפון 212-639-2000. בקשי לשוחח עם הרופא התורן הממלא את מקום ספק שירותי הרפואה שלך.

שירותי תמיכה

בסעיף זה מפורטים שירותי התמיכה. אלה יכולים לסייע לך להתכונן לניתוח ולהתאושש לאחריו.

תוך כדי קריאת סעיף זה, מומלץ לרשום את השאלות שברצונך לשאול את הרופא שלך.

שירותי התמיכה של MSK

משרד קבלה

212-639-7606

אנא צור קשר אם יש לך שאלות בנוגע לאשפוז בבית החולים, כגון בקשה לחדר פרטי.

מחלקת הרדמה

212-639-6840

אנא צור קשר אם יש לך שאלות אודות [תהליך ההרדמה](#).

חדר תרומת דם

212-639-7643

אנא צור קשר לקבלת מידע במידה שאתה מעוניין במתן **תרומת דם או טסיות**.

Bobst International Center

332-699-7968

אנו מקבלים בברכה מטופלים מכל רחבי העולם, ו**מציעים מגוון שירותים** לעזרה. אם הינך מטופל בינלאומי, אנא התקשר לעזרה בתיאום הטיפול.

מרכז הייעוץ

www.msk.org/counseling

646-888-0200

אנשים רבים מוצאים שהייעוץ מסייע להם מאוד. מרכז הייעוץ שלנו מספק שירותי ייעוץ ליחידים, זוגות, משפחות וקבוצות. יש באפשרותנו גם לרשום תרופות לסיוע במקרים של חרדה או דיכאון. בקש הפנייה מאחד מחברי צוות הטיפול שלך, או התקשר למספר שלמעלה כדי לקבוע פגישה.

Food Pantry Program

646-888-8055

אנו מספקים מזון לאנשים הזקוקים לכך במהלך טיפולי הסרטן. שוחח עם חבר בצוות הטיפול שלך, או התקשר למספר שלמעלה כדי לקבל מידע נוסף.

שירות הרפואה האינטגרטיבית

www.msk.org/integrativemedicine

שירות הרפואה האינטגרטיבית שלנו מציע טיפולים רבים כהשלמה (בשילוב עם) לטיפול רפואי מסורתי. לדוגמה, אנו מציעים טיפול במוזיקה, טיפולי

גוף/נפש, טיפול במחול ותנועה, יוגה וטיפול במגע. לקביעת פגישה עבור שירותים אלה, יש להתקשר למספר 1010-449-646.

ניתן גם לקבוע פגישת יעוץ עם רופא במסגרת שירות הרפואה האינטגרטיבית. הרופא יעבוד איתך יחד כדי לבנות תוכנית לאורח חיים בריא ולניהול תופעות הלוואי. לקביעת פגישת ייעוץ, יש להתקשר למספר 8550-608-646.

ספריית MSK

library.mskcc.org

212-639-7439

באפשרותך לבקר באתר הספרייה שלנו או להתקשר כדי לדבר עם צוות הספרייה. הצוות יוכל לסייע לך למצוא מידע נוסף על סוג הסרטן המסויים שלך. ניתן גם לעיין במקור המידע [המדריך החינוכי למטופלים ולצרכנים של שירותי הרפואה](#) שבספרייה.

שירותי תזונה

www.msk.org/nutrition

212-639-7312

שירותי התזונה שלנו כוללים יעוץ תזונתי בליווי של דיאטנית-תזונאית קלינית. התזונאית הקלינית תדבר איתך על הרגלי האכילה שלך. היא תוכל גם לייעץ לגבי אכילה במהלך ולאחר הטיפול. בקש הפנייה מאחד מחברי צוות הטיפול שלך, או התקשר למספר שלמעלה כדי לקבוע פגישה.

חינוך למטופלים ולקהילה

www.msk.org/pe

בקר באתר האינטרנט החינוכי למטופלים ולקהילה כדי לחפש מקורות מידע חינוכיים, סרטונים ותוכניות מקוונות.

חיוב מטופלים

646-227-3378

התקשר למחלקה לחיוב מטופלים בכל שאלה בנוגע לאישור מראש מול חברת הביטוח שלך. זה מכונה אישור מראש.

משרד נציג המטופלים

212-639-7202

אנא התקשר אם יש לך שאלות בנוגע לטופס ייפוי כוח בריאותי או אם יש לך דאגות או חששות בנוגע לטיפול.

איש הקשר לשירותי סיעוד פריאופרטיביים

212-639-5935

ניתן להתקשר אם יש לך שאלות לגבי מדיניות MSK בנוגע לשחרור מידע במהלך הניתוח שלך.

שירות אחיות ומלווים פרטיים

917-862-6373

ניתן לבקש שירות אחיות או מלווים פרטיים לטיפול בכך בעת שהותך בבית החולים ובבית. התקשר לקבלת מידע נוסף.

שירותי שיקום

www.msk.org/rehabilitation

סרטן וטיפולים בסרטן עלולים לגרום לתחושת חולשה, נוקשות או מתח בגוף. חלק מהטיפולים עלולים לגרום לבצקת לימפית (נפיחות). הפיזיותרפיה (רופאים המתמחים בשיקום), המרפאים בעיסוק והפיזיותרפיסטים שלנו יכולים לעזור לך לשוב לפעילויות הרגילות שלך.

• **רופאים המתמחים בשיקום מאבחנים ומטפלים בבעיות המשפיעות על דרך התנועה ואופן הפעילות שלך.** הם יכולים לתכנן ולסייע לך לתאם

את תוכנית טיפולי השיקום שלך, בין אם ב-MSK ובין אם במיקום אחר הקרוב יותר לביתך. ניתן להתקשר למחלקה לרפואת שיקום (פיזיאטריה) בטלפון 646-888-1929 לקבלת מידע נוסף.

- **מרפאים בעיסוק** יוכלו לסייע לך במידה ואתה מתקשה בביצוע פעילויות יומיומיות. לדוגמה, הם יוכלו להמליץ לך על כלים שיכולים להקל על מטלות יומיומיות. פיזיותרפיסטים יוכלו ללמד אותך תרגילים שיעזרו לך להתחזק ולשפר את הגמישות. ניתן להתקשר למחלקה לטיפול שיקום (פיזיאטריה) בטלפון 646-888-1900 לקבלת מידע נוסף.

מקורות מידע עבור תוכנית RLAC (Resources for Life after Cancer)
646-888-8106

ב-MSK, הדאגה לרווחתך אינה מסתיימת לאחר הטיפול שלך. תוכנית RLAC מיועדת לחולים שסיימו את הטיפול ולבני משפחותיהם.

תוכנית זו מציעה שירותים רבים. אנו מציעים ימי עיון, סדנאות, קבוצות תמיכה, וייעוץ לחיים שלאחר הטיפול. נוכל גם לסייע בנושאים ביטוחיים ובנושאי תעסוקה.

תוכניות לבריאות מינית

סרטן וטיפולים בסרטן יכולים להשפיע על הבריאות המינית שלך, על הפוריות שלך או על שתיהן. התוכניות לבריאות מינית של MSK יכולות לסייע לך לפני, במהלך או לאחר הטיפול שלך.

- **התכנית לרפואה מינית לנשים ובריאות האישה** עשויה לסייע עם בעיות בבריאות המינית, כגון הקדמת גיל המעבר או בעיות פוריות. ניתן לבקש הפנייה מאחד מחברי צוות הטיפול, או להתקשר למספר 646-888-5076 כדי לקבל מידע נוסף.

- **התכנית לרפואה מינית ורפואת מערכת הרבייה לגברים** עשויה לסייע

בבעיות בבריאות המינית, כגון הפרעות זיקפה (ED). ניתן לבקש הפנייה מאחד מחברי צוות הטיפול, או להתקשר למספר 646-888-6024 כדי לקבל מידע נוסף.

עבודה סוציאלית

www.msk.org/socialwork

212-639-7020

עובדים סוציאליים מסייעים למטופלים, למשפחותיהם ולחבריהם להתמודד עם נושאים הנפוצים בקרב חולי סרטן. הם מספקים קבוצות ייעוץ ותמיכה פרטניות לאורך כל הטיפול. הם יכולים לסייע לך לתקשר עם ילדים ועם בני משפחה אחרים.

העובדים הסוציאליים שלנו יכולים גם לסייע בהפניה לסוכנויות ותוכניות קהילתיות. אם אתה מתקשה לשלם את החשבונות שלך, תוכל גם לקבל מהם מידע לגבי משאבים כספיים. התקשר למספר שלמעלה כדי לקבל מידע נוסף.

טיפול רוחני

212-639-5982

אנשי הדת (יועצים רוחניים) שלנו זמינים לצורך האזנה, סיוע בתמיכה בבני משפחה ותפילה. באפשרותם ליצור קשר עם קבוצות קהילה או אמונה, או פשוט להוות בני לוויה ונוכחות רוחנית מנחמת. באפשרותו של כל אחד לבקש **תמיכה רוחנית**. אינך חייב/ת להשתייך לקבוצה דתית מסוימת (חיבור לדת).

הקפלה הבין-דתית של MSK ממוקמת ליד הלובי הראשי של בית החולים. היא פתוחה 24 שעות ביממה. במקרה חירום, יש להתקשר לטלפון 212-639-2000. בקש/י לשוחח עם איש הדת התורן.

Tobacco Treatment Program

www.msk.org/tobacco

212-610-0507

אם ברצונך להפסיק לעשן, ל-MSK יש מומחים שיכולים לסייע בכך. התקשר לקבלת מידע נוסף.

תוכניות וירטואליות

www.msk.org/vp

אנו מציעים חינוך מקוון ותמיכה לחולים ולמטפליהם. תוכניות אלה הינן מפגשים חיים בהם ניתן לדבר או רק להקשיב. ניתן ללמוד על האבחנה שקיבלת, למה לצפות במהלך הטיפול וכיצד להתכונן לטיפול בסרטן.

המפגשים הינם פרטיים, חינוכיים ומובלים על ידי צוות מומחים. בקרו באתר שלנו לקבלת מידע נוסף אודות התוכניות הווירטואליות או כדי להירשם.

שירותי תמיכה חיצוניים

Access-A-Ride

web.mta.info/nyct/paratran/guide.htm

877-337-2017

בעיר ניו יורק, רשות התחבורה העירונית (MTA) מציעה שירות נסיעה משותפת, מדלת לדלת, עבור אנשים עם מוגבלויות שאין באפשרותם לנסוע באוטובוס או ברכבת התחתית.

Air Charity Network

www.aircharitynetwork.org

877-621-7177

מספקים שירותי הסעות למרכזי טיפול.

האגודה האמריקאית לסרטן (ACS)

www.cancer.org

(800-227-2345) ACS-2345-800

מציעים מגוון שירותים ומידע, הכוללים את Hope Lodge, מקום שבו מטופלים ומטפלים יכולים לשהות בחינם בזמן טיפולי הסרטן שלהם.

Cancer and Careers

www.cancerandcareers.org

646-929-8032

מקור מידע לשם חינוך, מתן כלים ועריכת אירועים לעובדים החולים בסרטן.

CancerCare

www.cancercare.org

800-813-4673

השדרה השביעית 275 (בין רחובות מערב 25 ו-26)

ניו יורק, ניו יורק 10001

מספקים שירותי יעוץ, קבוצות תמיכה, סדנאות למידה, פרסומים ועזרה כלכלית.

Cancer Support Community

www.cancersupportcommunity.org

מספקים תמיכה וחינוך לאנשים שנפגעו מסרטן.

Caregiver Action Network

www.caregiveraction.org

800-896-3650

מספקים חינוך ותמיכה עבור אנשים המטפלים ביקיריהם הסובלים ממחלה כרונית או מוגבלות.

Corporate Angel Network
www.corpangelnetwork.org

866-328-1313

מציעים טיסות בחינם לטיפולים בכל רחבי הארץ תוך שימוש במושבים פנויים במטוסי חברה.

Good Days
www.mygooddays.org

877-968-7233

מציעים עזרה כלכלית בתשלומים שיתופיים (copayment) במהלך הטיפול. על המטופלים להיות בעלי ביטוח רפואי, לעמוד בקריטריוני ההכנסה, ולהיות בעלי מרשמים לתרופות הנמצאות במסגרת סל הבריאות של Good Days.

Healthwell Foundation
www.healthwellfoundation.org

800-675-8416

מספקים עזרה כלכלית לכיסוי תשלום שיתופי (copayment), פרמיות של שירותי רפואה ותשלומי השתתפות עצמית (deductibles) עבור תרופות וטיפולים מסוימים.

Joe's House
www.joeshouse.org

877-563-7468

מספקים רשימת מקומות לשהייה הסמוכים למרכזי טיפול עבור אנשים החולים בסרטן ומשפחותיהם.

LGBT Cancer Project
www.lgbtcancer.com

מספקים תמיכה והגנה משפטית עבור קהילת הלהט"ב, כולל קבוצות תמיכה מקוונות ומאגרי מידע של מחקרים קליניים הידידותיים לקהילת הלהט"ב.

LIVESTRONG Fertility

www.livestrong.org/we-can-help/fertility-services

855-744-7777

מספקים מידע אודות רבייה ותמיכה לחולים ולמחלימים מסרטן, שלטיפולים הרפואיים שעברו קיים סיכון הקשור לאי פוריות.

Look Good Feel Better Program

www.lookgoodfeelbetter.org

(LOOK (800-395-5665-800-395

תוכנית זו מציעה סדנאות בהן ניתן ללמוד דברים שאפשר לעשות כדי להרגיש טוב יותר לגבי המראה שלך. למידע נוסף או להרשמה לסדנה, נא להתקשר למספר שלעיל או לבקר באתר התוכנית.

National Cancer Institute

www.cancer.gov

(CANCER (800-422-6237-800-4

National LGBT Cancer Network

www.cancer-network.org

מספקים חינוך, הדרכה וסיוע משפטי עבור להט"בים שהחלימו מסרטן וכאלה הנמצאים בסיכון.

Needy Meds

www.needy meds.org

מספקים רשימה של תוכניות סיוע למטופלים עבור מותגי תרופות ותרופות

גנריות.

NYRx

www.health.ny.gov/health_care/medicaid/program/pharmacy.htm

מספקים הטבות מרשם לעובדים זכאים ולגמלאים של המגזר הציבורי
במדינת ניו יורק.

Patient Access Network (PAN) Foundation

www.panfoundation.org

866-316-7263

מספקים סיוע בתשלומים שיתופיים (copayments) עבור מטופלים עם
ביטוח.

Patient Advocate Foundation

www.patientadvocate.org

800-532-5274

מספקים גישה לטיפולים, סיוע כלכלי, סיוע ביטוחי, סיוע בשימור עבודה
וגישה למדריך המשאבים הלאומי של תתי המבוטחים.

Professional Prescription Advice

www.pparx.org

888-477-2669

מסייעים למטופלים זכאים ללא כיסוי לתרופות מרשם לקבל תרופות בחינם
או בעלות מופחתת.

(לשעבר Gilda's Club) Red Door Community

www.reddoorcommunity.org

212-647-9700

מקום שבו אנשים החיים עם סרטן יוכלו למצוא תמיכה חברתית ורגשית

באמצעות נטוורקינג, סדנאות, הרצאות ופעילויות חברתיות.

RxHope

www.rxhope.com

877-267-0517

מספקים סיוע בהשגת תרופות לאנשים שידם אינה משגת.

Triage Cancer

www.triagecancer.org

מספקת מידע ומשאבים בנושאים משפטיים, רפואיים ופיננסיים עבור מטופלי סרטן ומטפליהם.

שירותי תמיכה למטופלות סרטן השד

SHARE

www.sharecancersupport.org

866-891-2392

מציע קבוצות תמיכה לשורדות סרטן שד, סרטן שד גרורתי וסרטן שחלות במנהטן, קווינס, ברוקלין וסטטן איילנד.

Susan G. Komen

www.komen.org

ארגון המספק שירותי מידע ותמיכה לסובלים מסרטן השד.

Triple Negative Breast Cancer Foundation

www.tnbcfoundation.org

מספק מידע שיעזור לאנשים להבין מהו סרטן שד שלילי לשלושת הסמנים.

מקורות חינוכיים

סעיף זה מפרט את המשאבים החינוכיים המוזכרים במדריך זה. אלה

יסייעו לך להתכונן לניתוח ולהתאושש לאחריו.

תוך כדי קריאת מקורות מידע אלה, מומלץ לרשום את השאלות שברצונך לשאול את הרופא שלך.

- *A Guide for Caregivers* (<https://sandbox18.mskcc.org/cancer-care/patient-education/guide-caregivers>)
- *Common Questions About MSK's Recovery Tracker* (<https://sandbox18.mskcc.org/cancer-care/patient-education/mymsk-recovery-tracker>)
- *Advance Care Planning for People With Cancer and Their Loved Ones* (<https://sandbox18.mskcc.org/cancer-care/patient-education/advance-care-planning>)
- *Call! Don't Fall!* (<https://sandbox18.mskcc.org/cancer-care/patient-education/call-dont-fall>)
- *Caring for Your Jackson-Pratt Drain* (<https://sandbox18.mskcc.org/cancer-care/patient-education/caring-your-jackson-pratt-drain>)
- *Exercises After Your Mastectomy or Breast Reconstruction* (<https://sandbox18.mskcc.org/cancer-care/patient-education/exercises-after-mastectomy-or-reconstruction>)
- *Fertility Preservation Before Cancer Treatment: Options for People Born with Ovaries and a Uterus* (<https://sandbox18.mskcc.org/cancer-care/patient-education/fertility-preservation-females-starting-treatment>)
- *Frequently Asked Questions About Walking After Your Surgery*

([https://sandbox18.mskcc.org/cancer-care/patient-education/frequently-asked-questions-about-walking-after-\(your-surgery](https://sandbox18.mskcc.org/cancer-care/patient-education/frequently-asked-questions-about-walking-after-(your-surgery)

• הנחיות טיפול ביד ובזרוע לאחר כריתת בלוטות לימפה בבית השחי

([https://sandbox18.mskcc.org/he/cancer-care/patient-education/hand-and-arm-care-after-removal-axillary-lymph-\(nodes](https://sandbox18.mskcc.org/he/cancer-care/patient-education/hand-and-arm-care-after-removal-axillary-lymph-(nodes)

• *Herbal Remedies and Cancer Treatment*

(<https://sandbox18.mskcc.org/cancer-care/patient-education/herbal-remedies-and-treatment>

• *How to Be a Health Care Agent*

(<https://sandbox18.mskcc.org/cancer-care/patient-education/how-be-health-care-agent>

• *How To Check if a Medicine or Supplement Has Aspirin, Other NSAIDs, Vitamin E, or Fish Oil*

([https://sandbox18.mskcc.org/cancer-care/patient-education/common-medications-containing-aspirin-and-other-\(nonsteroidal-anti-inflammatory-drugs-nsaids](https://sandbox18.mskcc.org/cancer-care/patient-education/common-medications-containing-aspirin-and-other-(nonsteroidal-anti-inflammatory-drugs-nsaids)

• *How to Enroll in MyMSK: Memorial Sloan Kettering's Patient Portal* (<https://sandbox18.mskcc.org/cancer-care/patient-education/video/how-enroll-mysk-patient-portal>

• *How To Use Your Incentive Spirometer*

(<https://sandbox18.mskcc.org/cancer-care/patient-education/how-use-your-incentive-spirometer>

• *Resources, Clothing, and Support After Breast Reconstruction*

Surgery(<https://sandbox18.mskcc.org/cancer-care/patient-education/resources-clothing-support-breast-reconstruction>

• מה אפשר לעשות כדי להימנע מנפילה

<https://sandbox18.mskcc.org/he/cancer-care/patient-education/what-you-can-do-avoid-falling>

למידע נוסף על בצקת לימפטית, ניתן לקרוא את משאב המידע של מחלקת הבריאות של מדינת ניו יורק *"להבין מהי בצקת לימפטית"*.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000

למשאבים נוספים אנא בקר/י ב- www.mskcc.org/pe כדי לחפש בספריה הוירטואלית שלנו.

About Your Mastectomy - Last updated on June 4, 2024
כל הזכויות בבעלות ושמורות ל-Memorial Sloan Kettering Cancer Center