



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

Диета BRATT — Фаза 2

В этом материале описано, что можно есть в ходе 2 фазы диеты BRATT (**Banana, Rice, Applesauce, Tea, Toast — банан, рис, яблочное пюре, чай, тост**).

Цель диеты BRATT — облегчить симптомы, связанные с желудочно-кишечным трактом, такие как диарея (жидкий или водянистый стул) или рвота. По мере ослабления симптомов важно постепенно добавлять в рацион привычные блюда.

Диета BRATT ограничивает продукты, которые вы можете употреблять. Важно проконсультироваться с вашим клиническим врачом-диетологом, чтобы рацион отвечал вашим потребностям в потреблении калорий, белка и других питательных элементов.

Виды клетчатки

Клетчатка — это вид углеводов, которые ваш организм не может переварить. Существует 2 основных вида клетчатки:

Нерастворимая клетчатка. Этот тип клетчатки может быстро проходить через организм и усугублять диарею. Нерастворимая клетчатка содержится в кожуре фруктов и овощей, в бобовых (например, фасоли и чечевице), семенах и цельных злаках. Продукты этих типов не рекомендуется употреблять в ходе диеты BRATT.

Растворимая клетчатка. Этот тип клетчатки растворяется в воде и превращается в гель. Это может сделать ваш стул более твердым. Растворимая клетчатка содержится в овсе, персиках, бананах и рисе. Продукты этих типов рекомендуется употреблять в ходе диеты BRATT.

Потребление жидкости

Важно не только изменить употребляемые продукты, но и пить много воды, жидкостей и есть супы. Подойдут также напитки, содержащие электролиты, например спортивные напитки и прозрачные жидкие пищевые добавки. Употребление достаточного количества жидкости поможет избежать обезвоживания (недостатка воды в организме).

Лучше выпивать большую часть жидкости между приемами пищи, а не во время них. Это избавит вас от ощущения переполнения во время приемов пищи.

Фазы диеты BRATT

Диета BRATT состоит из 2 фаз. Ниже описана вторая фаза диеты.

В ходе этой фазы к продуктам, разрешенным во время первой фазы, добавляются дополнительные продукты. Эти продукты добавляются в ваш рацион, когда продукты из 1 фазы будут усваиваться без усугубления симптомов, связанных с желудочно-кишечным трактом.

Группа продуктов	Употреблять в пищу
Молоко и молочные продукты	• Рисовое молоко • Lactaid® • Соевое молоко • Миндальное молоко • Овсяное молоко • Соевый сыр • Йогурт без наполнителей
Овощи	• Запеченный или вареный картофель либо сладкий картофель-батат без кожуры или картофельное пюре • Запеченная, жареная или вареная юкка либо пюре из юкки • Запеченные, жареные или вареные плантаны либо пюре из плантанов • Консервированные или хорошо

	приготовленные овощи без семян, стеблей и кожуры (например, стручковая фасоль, тыква, морковь и спаржа)
Фрукты и соки	• Бананы • Яблочное пюре • Запеченные очищенные яблоки • Консервированные мягкие фрукты • Дыня (например, мускусная или мускатная дыня либо арбуз) — не более 1 чашки в день • Разбавленный водой фруктовый сок (кроме сливового) без мякоти
Хлеб и крупы	• Хлебобулочные изделия из белой пшеничной муки (в том числе пшеничные лепешки, английские маффины или бублики) • Соленые или рисовые крекеры и крекеры Грэхема • Лапша и макаронные изделия • Кускус • Мягкие крендели • Хлопья с содержанием клетчатки менее 3 граммов (например, Rice Krispies®, Rice Chex® или Corn Flakes®), каши Cream of Rice® • Овсяная крупа (не дробленая) • Белый рис • Рисовая каша
Белки	• Жареная или запеченная курица (без кожи) • Жареная или запеченная индейка (без кожи) • Жареная или запеченная постная рыба (треска, морской окунь, минтай, камбала,

	палтус или тилапия) • Яйца, сваренные вкрутую или всмятку, яичница-болтунья, яйца-пашот, яичные белки или Egg Beaters (не более 2 целых яиц в день) • Сыр тофу • Кремообразное ореховое масло, например арахисовое, миндальное масло, масло кешью и т. д. (1 столовая ложка в день)
Напитки	• Напитки с электролитами (например, Pedialyte®) • Кофе без кофеина (с Lactaid или молоком растительного происхождения или без него) • Чай (без кофеина) • Спортивный напиток Gatorade® • Crystal Lite® • Обычные или диетические газированные напитки без кофеина (например имбирный эль, 7UP®, Sprite®, кола), минеральная вода • Смузи из любых продуктов, приведенных в этом материале

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

BRATT Diet Phase 2 - Last updated on February 17, 2023

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center