



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

Локализация образований молочной железы иглой

Эта информация поможет вам подготовиться к процедуре локализации образований молочной железы иглой в центре Memorial Sloan Kettering (MSK).

Локализация образований молочной железы иглой - это процедура, выполняемая для определения и обозначения точного местонахождения патологических тканей молочной железы. Это поможет вашему врачу легко найти эту область во время операции.

До процедуры

Необходимость снять устройства

Вы можете носить определенные устройства на теле. Перед сканированием или процедурой производители устройств рекомендуют снять следующее:

- глюкометр непрерывного действия (CGM);
- инсулиновая помпа.

Обратитесь к своему медицинскому сотруднику, чтобы назначить визит ближе к дате плановой замены устройства. Убедитесь в том, что вы взяли с собой запасное устройство, которое вы можете надеть после сканирования или процедуры.

Возможно, вы не знаете, как контролировать уровень глюкозы, когда ваше устройство выключено. В этом случае перед приемом поговорите с

медицинским сотрудником, у которого вы наблюдаетесь по поводу сахарного диабета.

День проведения процедуры

- Не наносите никаких средств на грудь, соски или в области подмышек в день процедуры. Это касается пудры, дезодоранта, духов, одеколона и кремов.
- Наденьте рубашку, которую можно легко снять.
- Соблюдайте все дополнительные инструкции своего медицинского сотрудника.

Во время процедуры

Процедура локализации образований молочной железы иглой проводится во время маммографии, когда грудь сжата. Если ваш врач не обнаруживает патологических тканей на маммограмме, вместо нее можно провести ультразвуковое исследование или магнитнорезонансную томографию (МРТ). Это процедуры медицинской визуализации, которые позволяют врачу увидеть патологические ткани.

Обнаружив патологическую ткань, радиолог сделает в эту область инъекцию (укол) местного анестетика (лекарства, которое вызовет онемение этого участка).

После онемения этой области радиолог введет вам в грудь иглу с тонкой проволоочкой. Чтобы убедиться в том, что игла находится в правильном положении, выполняется ряд снимков груди методом маммографии. Затем игла удаляется, а проволочка остается в груди. Чтобы установить точное местонахождение проволочки, снова выполняется ряд снимков.

Проволочка покрывается куском марли и приклеивается пластырем к коже. Благодаря этой проволочке, ваш врач обнаружит патологическую ткань молочной железы во время операции.

После процедуры

После процедуры сотрудники MSK доставят вас из отделения визуализационного исследования груди (отделение Радиологии) (Breast Imaging Department in Radiology) на ваш следующий прием.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

Breast Needle Localization - Last updated on February 7, 2022

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center