



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И  
УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

# Гастроэзофагеальный рефлюкс

Эта информация разъясняет причины, симптомы и порядок лечения гастроэзофагеального рефлюкса (GERD).

## О заболевании GERD

GERD — это нарушение, при котором содержимое желудка попадает обратно в пищевод. Пищевод — это трубчатый орган, по которому пища и жидкости проходят из полости рта в желудок (см. рисунок 1).




Рисунок 1. Пищевод и желудок человека

---

GERD может вызывать эзофагит, то есть воспаление (покраснение и отек) выстилки пищевода. Если вы не будете лечить эзофагит, он может привести к появлению язв, кровотечению и сужению пищевода. Он также может увеличить риск развития рака пищевода.

## **Причины GERD**

GERD может быть вызвана различными причинами, включая:

- Употребление большого количества пищи за один

раз

- Употребление в большом количестве:
  - жареной и жирной пищи;
  - острую пищу;
  - цитрусовых, например апельсинов, лимонов, грейпфрутов и лаймов;
  - шоколада;
  - Мята
  - томаты.
  - напитков с кофеином, например кофе, чая и газированных напитков.
- Выполнение физических упражнений сразу после еды.
- Лежачее положение, в особенности сразу после еды. Оно может способствовать возникновению отрыжки (перемещению пищи из желудка в пищевод, при котором появляется неприятный кислый привкус от желудочного сока).
- курение.
- алкогольные напитки;
- Наличие грыжи пищеводного отверстия, когда верхняя часть желудка выпирает через диафрагму.

Диафрагма — это мышца, отделяющая грудную полость от брюшной полости (живота).

- Беременность.
- ожирение (избыточное нездоровое количество телесного жира);
- Сдавливание брюшной полости. Это может произойти, если:
  - тужитесь при опорожнении кишечника (когда вы ходите в туалет по-большому) из-за запора (когда опорожнение кишечника происходит реже обычного);
  - напрягаетесь при кашле, наклонах или при подъеме тяжестей;
  - носите брюки со слишком тугим поясом — из-за этого содержимое желудка может выдавливаться вверх и в пищевод.

## **Симптомы GERD**

Симптомы GERD могут включать:

- изжогу, которая обычно появляется через 30-60 минут после еды;
- отрыжку;
- проблемы с глотанием;

- боль в груди;
- кашель;
- боль в горле;
- ощущение кома в горле.

## **Лечение GERD**

Цель лечения GERD заключается в облегчении симптомов. Большинство людей начинает чувствовать себя лучше после приема лекарств и изменения образа жизни. Далее перечислены некоторые способы, с помощью которых вы можете облегчить симптомы GERD:

- Не ешьте большое количество пищи за один раз. Принимайте пищу небольшими порциями, но чаще. Это позволит вам съесть то же количество пищи, но меньшими порциями, которые будет проще переварить.
- Не ложитесь в течение как минимум 2-3 часов после еды.
- Не перекусывайте поздно вечером.
- Воздержитесь от употребления некоторых продуктов питания, например:
  - конфет, жевательной резинки и леденцов со

- вкусом перечной и кудрявой мяты;
- жареной и жирной пищи;
- Воздержитесь от употребления некоторых напитков, например:
  - кислых соков, таких как апельсиновый сок;
  - алкоголь.
  - чая из перечной и кудрявой мяты;
  - напитков с кофеином, например кофе и чая;
  - газированных (шипучих) напитков, например сладкой газированной воды.
- Принимайте антациды (лекарства, нейтрализующие кислоту в желудке) или сидите прямо, чтобы облегчить изжогу.
- Не курите сигареты и не используйте другую табачную продукцию. В центре MSK есть специалисты, которые могут помочь вам бросить курить. Если вам необходима дополнительная информация о нашей программе лечения табакозависимости (Tobacco Treatment Program), позвоните по номеру 212-610-0507. Вы также можете получить информацию об этой программе у своего медицинского сотрудника.
- С помощью блоков приподнимите изголовье своей

кровати или спите на подушке в форме клина, чтобы верхняя часть туловища была приподнята. Это поможет справиться с симптомами ночью. Купить клиновидную подушку можно в ближайшей аптеке или в магазине медицинских изделий.

- Не допускайте сдавливания брюшной полости.
  - Ограничьте наклоны и интенсивную физическую нагрузку после еды.
  - Не носите тесную одежду.
- Предотвращайте или лечите запоры. Для получения дополнительной информации о том, как справиться с запорами, прочитайте материал *Запор* (<https://sandbox18.mskcc.org/ru/cancer-care/patient-education/constipation>).
- Если у вас лишний вес, для достижения здорового веса вам нужно потреблять меньше калорий, чем необходимо вашему организму, увеличить физическую активность или же прибегнуть к обоим способам. Для получения дополнительной информации о том, как сделать выбор в пользу здорового питания и физической нагрузки, прочитайте материал *Как улучшить здоровье через питание* (<https://sandbox18.mskcc.org/ru/cancer-care/patient-education/eat-your-way-to-better-health>).

- Обязательно принимайте лекарство, назначенное вашим врачом, согласно его указаниям.

## **Когда следует обращаться к своему медицинскому сотруднику?**

Позвоните своему медицинскому сотруднику, если наблюдается что-либо из нижеперечисленного:

- ваши симптомы не начали исчезать после того, как вы попробовали способы лечения выше;
- появились проблемы с глотанием;

Если у вас появились вопросы, свяжитесь непосредственно с сотрудником вашей медицинской бригады. Если вы являетесь пациентом центра MSK, и вам нужно обратиться к медицинскому сотруднику после 17:00а также в выходные и праздничные дни, звоните по номеру 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe).

Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) - Last updated on October 6, 2022

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center