



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

О закупоривании дренажного катетера желчных путей

Эта информация разъясняет, как выполнить пробное закупоривание дренажного катетера желчных путей.

Информация о пробном закупоривании

Ваш врач может порекомендовать вам выполнить пробное закупоривание дренажного катетера желчных путей. Это необходимо для того, чтобы убедиться, что желчь может без труда проходить через ваш организм. Желчь — это жидкость, которая вырабатывается в печени. Она помогает переваривать пищу. Пробное закупоривание также поможет убедиться, что ваши желчные протоки открыты. Желчные протоки — это трубки в вашем организме, по которым желчь переносится в печень и из нее.

Закупоривание дренажного катетера способствует прохождению желчи по катетеру в организм. Если пробное закупоривание пройдет успешно, вам больше не понадобится дренажный мешок (см. рисунок 1).




Рисунок 1. Закрытый дренажный катетер желчных путей

Медсестра/медбрат может закупорить ваш катетер, пока вы находитесь в больнице. Когда вы будете дома, вам придется делать это самостоятельно.

Как закупорить дренажный катетер

1. Подготовьте все необходимое. Вам потребуется:
 - спиртовая салфетка;
 - безыгольный соединитель.
2. Отсоедините кран от дренажного катетера (см. рисунок 2).

Рисунок 2. Отсоединение крана от дренажного катетера




Рисунок 2. Отсоединение крана от дренажного катетера

3. Протрите конец дренажного катетера спиртовой салфеткой в течение 15 секунд (см. рисунок 3).

Рисунок 3. Очистка конца дренажного катетера




Рисунок 3. Очистка конца дренажного катетера

4. Подсоедините безыгольный соединитель к концу дренажного катетера (см. рисунок 4).




Рисунок 4. Подсоединение безыгольного соединителя к дренажному катетеру

Не забывайте промывать катетер по установленному графику. Вам не нужно снимать безыгольный соединитель во время промывания. Протрите безыгольный соединитель спиртовой салфеткой, продолжая делать это в течение 15 секунд. Затем подсоедините шприц к безыгольному соединителю и промойте катетер через него.

Не забывайте менять безыгольный соединитель каждые 7 дней или при его загрязнении.

При закупоренном катетере

Если вы закупорили дренажный катетер желчных путей, вам необходимо следить за следующими симптомами:

- подтекание в месте установки катетера;
- температура 100,4 °F (38 °C) и выше или озноб;
- боль, зачастую в брюшной полости (в животе) или в месте установки катетера.

Эти симптомы могут возникать в любое время после закупоривания катетера. Если у вас появился какой-либо из этих симптомов, позвоните и сообщите об этом в отделение интервенционной радиологии (Interventional Radiology). Затем откупорьте катетер. Для этого отсоедините безыгольный соединитель от катетера. Протрите катетер спиртовой салфеткой, продолжая делать это в течение 15 секунд, и подсоедините его к новому дренажному мешку. Симптомы должны исчезнуть в течение 30–45 минут. Если это не произошло, позвоните в отделение интервенционной радиологии для получения дальнейших инструкций.

Не закупоривайте катетер вновь, не позвонив сначала в отделение интервенционной радиологии.

Контактная информация

Если у вас возникли какие-либо вопросы или опасения, позвоните вашему врачу отделения интервенционной радиологии. Вы можете связаться с врачом с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. После 17:00, а также в выходные или праздничные дни звоните по номеру 212-639-2000. Позовите к телефону дежурного специалиста отделения интервенционной радиологии.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

How to Cap Your Biliary Drainage Catheter - Last updated on February 11, 2023
Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center