



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И
УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

О закупоривании дренажного катетера желчных путей

Эта информация разъясняет, как выполнить пробное закупоривание дренажного катетера желчных путей.

Информация о пробном закупоривании

Ваш врач может порекомендовать вам выполнить пробное закупоривание дренажного катетера желчных путей. Это необходимо для того, чтобы убедиться, что желчь может без труда проходить через ваш организм. Желчь — это жидкость, которая вырабатывается в печени. Она помогает переваривать пищу. Пробное закупоривание также поможет убедиться, что ваши желчные протоки открыты. Желчные протоки — это трубки в вашем организме, по которым желчь переносится в печень и из нее.

Закупоривание дренажного катетера способствует прохождению желчи по катетеру в организм. Если пробное закупоривание пройдет успешно, вам больше

не понадобится дренажный мешок (см. рисунок 1).




Рисунок 1. Закрытый дренажный катетер желчных путей

Медсестра/медбрат может закупорить ваш катетер, пока вы находитесь в больнице. Когда вы будете дома, вам придется делать это самостоятельно.

Как закупорить дренажный катетер

1. Подготовьте все необходимое. Вам потребуется:
 - спиртовая салфетка;
 - безыгольный соединитель.
2. Отсоедините кран от дренажного катетера (см. рисунок 2).




Рисунок 2. Отсоединение крана от дренажного катетера

3. Протрите конец дренажного катетера спиртовой салфеткой в течение 15 секунд (см. рисунок 3).




Рисунок 3. Очистка конца дренажного катетера

4. Подсоедините безыгольный соединитель к концу дренажного катетера (см. рисунок 4).




Рисунок 4. Подсоединение
безыгольного соединителя к
дренажному катетеру

Не забывайте промывать катетер по установленному графику. Вам не нужно снимать безыгольный соединитель во время промывания. Протрите безыгольный соединитель спиртовой салфеткой, продолжая делать это в течение 15 секунд. Затем подсоедините шприц к безыгольному соединителю и промойте катетер через него.

Не забывайте менять безыгольный соединитель каждые 7 дней или при его загрязнении.

При закупоренном катетере

Если вы закупорили дренажный катетер желчных путей, вам необходимо следить за следующими симптомами:

- подтекание в месте установки катетера;
- температура 100,4 °F (38 °C) и выше или озноб;

- боль, зачастую в брюшной полости (в животе) или в месте установки катетера.

Эти симптомы могут возникать в любое время после закупоривания катетера. Если у вас появился какой-либо из этих симптомов, позвоните и сообщите об этом в отделение интервенционной радиологии (Interventional Radiology). Затем откупорьте катетер. Для этого отсоедините безыгольный соединитель от катетера. Протрите катетер спиртовой салфеткой, продолжая делать это в течение 15 секунд, и подсоедините его к новому дренажному мешку. Симптомы должны исчезнуть в течение 30–45 минут. Если это не произошло, позвоните в отделение интервенционной радиологии для получения дальнейших инструкций.

Не закупоривайте катетер вновь, не позвонив сначала в отделение интервенционной радиологии.

Контактная информация

Если у вас возникли какие-либо вопросы или опасения, позвоните вашему врачу отделения интервенционной радиологии. Вы можете связаться с врачом с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. После 17:00, а также в выходные или праздничные дни звоните по номеру 212-639-2000. Позовите к телефону дежурного специалиста отделения интервенционной радиологии.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

How to Cap Your Biliary Drainage Catheter - Last updated on February 11, 2023

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center