



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И  
УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

## **Приапизм (слишком длительная эрекция)**

Эта информация поможет понять, что делать в случае развития у вас приапизма.

### **Информация о приапизме**

Приапизм - это эрекция, которая длится слишком долго. Приапизм может возникнуть вне полового возбуждения и не прекращаться после оргазма.

Существует риск развития приапизма после пенильной инъекционной терапии.

При наличии полной эрекции в пенис не поступает новая кровь. Следовательно, пенис не получает кислород, что может вызвать поражение тканей и привести к постоянной эректильной дисфункции (ЭД).

### **Информация о Pseudoephedrine HCl (Sudafed®)**

При возникновении приапизма вам может помочь

псевдоэфедрина гидрохлорид (Sudafed®). Вы можете  
купить Рисунок 1. Псевдоэфедрина гидрохлорид (Судафед)  
его в

местной аптеке без рецепта, но упаковки с  
препаратом хранятся за прилавком аптеки.

Чтобы купить pseudoephedrine HCL, отнесите  
провизору карточку с изображением pseudoephedrine  
HCL, которая висит на полке (см. рисунок 1). Вам  
придется предъявить удостоверение личности с  
фотографией, прежде чем провизор продаст вам  
упаковку этого препарата. Не покупайте стоящий на  
полке псевдоэфедрина гидрохлорид. Это фенилэфрин  
(phenylephrine) и он не подходит для лечения  
приапизма.

Если у вас есть проблемы с сердцем,  
проконсультируйтесь со своим кардиологом,  
безопасно ли вам принимать псевдоэфедрина  
гидрохлорид.

Если вы проходите лечение с применением  
пенильных инъекций, обязательно имейте при себе  
pseudoephedrine HCL в течение всего курса лечения.

## **Если у вас развился приапизм**

- **Если у вас возникла эрекция, достаточная для**

**проникновения (6 баллов или выше по шкале твердости эрекции), которая длится 2 часа, примите 4 (30 мг) таблетки псевдоэфедрина гидрохлорида (Судафед).** Не принимайте таблетки замедленного высвобождения или длительного действия, например Sudafed 12 hour. Если у вас возникли вопросы, обратитесь к провизору или квалифицированному медработнику. Псевдоэфедрина гидрохлорид отправляется аптекой с рецептурно-производственным отделом во флаконе вместе со шприцами, либо же вы можете купить его в своей местной аптеке.

- Если в течение часа после приема псевдоэфедрина гидрохлорида эрекция стала слабее, чем необходимо для проникновения, позвоните на следующий день в офис своего медицинского сотрудника, чтобы поговорить с квалифицированным медработником. Вы не должны продолжать делать инъекции с той же дозировкой, если вы принимаете псевдоэфедрина гидрохлорид от длительной эрекции. Ваш квалифицированный медработник изменит дозу лекарства, используемого для проведения пенильной инъекционной терапии. Не делайте инъекцию снова, пока не обратитесь к своему медицинскому сотруднику.

- **Если эрекция длится 3 часа (эрекция не проходит через 1 час после приема pseudoephedrine HCl), позвоните своему фармацевту высшей категории.**
  - С понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 звоните квалифицированному медработнику.
  - С 17:00 до 9:00, а также в выходные и праздничные дни звоните по номеру 212-639-2000 и просите связать по телефону с дежурным урологом.
  - Обратитесь в Центр неотложной помощи MSK в Memorial Hospital (адрес: 1275 York Avenue, между East 67<sup>th</sup> Street и East 68<sup>th</sup> Street), если вы доберетесь до него менее чем за 30 минут. Квалифицированный медработник позвонит в Центр неотложной помощи, чтобы вас там ждали. Во время звонка вы получите дополнительные указания от квалифицированного медработника.
- **Если эрекция длится 4 часа, и вы не обращались к квалифицированному медработнику, такой случай считается чрезвычайной ситуацией.** Вы должны действовать так же безотлагательно, как и в случае

сердечного приступа. Эрекция, длящаяся более 4 часов, может повлечь за собой необратимое поражение эректильной ткани.

- Обратитесь в Центр неотложной помощи MSK, если вы доберетесь до него менее чем за 30 минут. Спросите у охранника на входе в больницу, как попасть в этот центр.
- Обратитесь в ближайший пункт неотложной медицинской помощи, если дорога до Memorial Hospital займет более 30 минут.
- Сообщите сотрудникам Центра неотложной помощи или пункта неотложной медицинской помощи, что в течение 4 часов у вас сохраняется эрекция. Медицинский сотрудник должен немедленно вас осмотреть. Если вам сразу же не окажут медицинскую помощь, у вас может возникнуть постоянная эректильная дисфункция.
- Передайте медицинскому сотруднику карточку о приапизме, которую вам выдали для ношения в кошельке. Вы также можете попросить медицинского сотрудника позвонить нам по указанным выше номерам.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe).

---

Priapism (An Erection that Lasts Too Long) - Last updated on May 6, 2021

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center