



ПАМ'ЯТКА ДЛЯ ПАЦІЄНТА ТА ОСОБИ, ЯКА ДОГЛЯДАЄ ЗА НИМ

Виписка з лікарні після аутологічної трансплантації стовбурових клітин

Ця інформація допоможе вам підготуватися до повернення додому після аутологічної трансплантації стовбурових клітин 4/21

У процесі ознайомлення з цим матеріалом робіть записи чи позначайте місця, що викликають у вас питання. Так ви не забудете поставити ці запитання своїй бригаді з трансплантації під час наступної зустрічі.

Перед випискою з лікарні

Перед вашим поверненням додому важливо, щоб ви та особа, яка доглядає за вами, підготувалися до цього. Як і раніше, вам потрібно дотримуватися запобіжних заходів для підтримки здоров'я та запобігання інфекції. Вкрай важливо, щоб ви взяли участь у плануванні догляду за вами вдома. Перед

випискою з лікарні ваша бригада з трансплантації складе разом із вами план подальшого догляду.

Ця фаза вашого одужання займе тривалий час — 1 рік (або більше) з моменту виписки після трансплантації. Варто пам'ятати: попри те, що склад вашої крові повертається до нормальних показників, ваша імунна система ще буде дуже слабкою. Як і раніше, ви маєте приймати ліки та дотримуватися запобіжних заходів для підтримки здоров'я та запобігання інфекції.

Впродовж цієї фази можуть проявитися деякі ускладнення, особливо ті, що впливають на ваші органи. Це може статися, навіть якщо вони досі не турбували вас.

Зазначений строк — це загальна рекомендація. Ваша бригада з трансплантації повідомить вам точніший термін.

Попереджуvalні медичні аксесуари

Перед випискою з лікарні вам потрібно замовити спеціальний попереджуvalний браслет або кулон. Ваша бригада з трансплантації допоможе вам із цим. Приклади компаній, що виготовляють такі медичні аксесуари: MedicAlert® (www.medicalert.org) та ROAD iD (www.roadid.com).

На браслеті або кулоні мають бути вигравірувані написи: «**Autologous stem cell transplant**» (Аутологічна трансплантація стовбурових клітин) і «**Irradiated cellular blood components and CMV-safe blood components only**» (Лише опромінені клітинні компоненти крові та компоненти крові, що не містять цитомегаловірус). Завдяки цьому фахівці швидкої допомоги чи співробітники лікарні будуть знати, що треба робити, якщо ви раптом потрапите в аварію та не зможете повідомити ці факти самостійно.

Повернення додому

Навіть якщо вас переповнюють радісні почуття, й ви відчуваєте готовність до повернення додому, ви можете дещо нервувати. Із наближенням дня виписки ви можете відчувати занепокоєння, у вас також можуть з'явитися побоювання. Це нормально. Вдома вам разом із вашими близькими людьми доведеться піклуватися про ваш догляд. Щоб навчитися робити це впевнено та не відчувати при цьому незручності, потрібен час. Під час візитів подальшого нагляду ваш соціальний працівник може допомогти вам отримати необхідні послуги й надати емоційну підтримку.

Пройде деякий час після виписки з лікарні, і ви знову звикнете до життя вдома. Вам може здаватися, що дії, необхідні для запобігання захворювань, привносять у ваше життя певну напруженість. Відчуття душевної рівноваги та комфорту прийде до вас із часом. Намагайтесь зберігати спокій і впевненість у собі.

Процес вашого одужання після трансплантації буде поступовим. Ймовірно, якийсь час ви не будете відчувати себе так, як до хвороби. Ви можете відчувати втому та слабкість, у вас може погіршитися апетит, і ви можете помітити зміни в смаках і запахах. Вам також потрібен час на відновлення сил, щоб знову почати займатися тим, що вам подобалося до виникнення хвороби та трансплантації.

Запобігання розвитку інфекції

На відновлення імунної системи після трансплантації, як правило, потрібно від 3 до 12 місяців. Перший рік після трансплантації можна порівняти з першим роком життя новонародженого. Весь цей час ви піддаєтесь ризику зараження. Ваша бригада з трансплантації буде перевіряти кількість клітин у крові, щоб стежити за тим, наскільки добре працює ваша імунна система. Залежно від результатів цих

аналізів, співробітники бригади можуть вносити зміни чи доповнення в наведені нижче рекомендації.

Ознайомтеся з деякими загальними порадами, що допомагають уникнути інфекції:

- Ознайомтеся з деякими загальними порадами, що допомагають уникнути інфекції: Часто мийте руки водою з антибактеріальним милом або обробляйте їх спиртовмісним антисептиком.
- Тримайтесь подалі від хворих людей або тих, хто нещодавно хворів.
- Надягайте маску в громадських місцях, або коли поруч із вами можуть бути незнайомі люди (якщо бригада з трансплантації надасть вам такі вказівки).

Нижче наведено ознаки, що можуть означати розвиток інфекції. Негайно зателефонуйте своєму лікарю, якщо у вас:

- температура 100,4 °F (38,0 °C) або вище —
 - не приймайте acetaminophen (Tylenol®) до отримання відповідних вказівок від свого медичного працівника;
 - вам не потрібно вимірювати температуру тіла щодня, але вимірюйте її регулярно, якщо погано

почуваєтесь;

- запалена (почервоніла, тепла на дотик) шкіра, надмірна пітливість або «приголомшивий» озnob;
- кашель, чхання, нежить, задишка чи дискомфорт у грудях;
- почервоніння, набряк або біль у горлі, в очах, вухах, на шкірі, в суглобах або черевній порожнині (животі);
- розмитий зір або інші порушення чіткості зору;
- часте сечовипускання (хочеться помочитися), відчуття печіння при сечовипусканні, чи ці симптоми разом;
- подразнення прямої кишки, зокрема печіння та біль;
- висип на тілі;
- невеликі пухирі, схожі на бульбашки герпесу, навколо рота чи на інших ділянках тіла;
- труднощі при промиванні тунельного катетера в ділянці грудної клітки, якщо його встановлено;
- озnob під час або після промивання тунельного катетера в ділянці грудної клітки, якщо його встановлено.

До повернення вашої імунної системи в нормальній

стан, ви можете легко підхопити віруси. Наприклад, збудник вітряної віспи й оперізувального герпесу. Якщо ви мали ризик зараження вітряною віспою чи оперізувальним герпесом, негайно зателефонуйте своєму лікарю або медсестрі/медбрратові вашої бригади з трансплантації. Вам слід прийти до лікарні, щоб працівники змогли визначити, чи потрібне вам лікування.

Крім того, у вас можуть повторно активуватися віруси, які вже потрапляли в організм. Наприклад, якщо в дитинстві ви перехворіли на вітряну віспу, у вас може знову активуватися вірус, що викликає вітряну віспу та оперізувальний герпес. Найчастіше це починає проявлятися хворобливістю шкіри й появою прищіків або бульбашок. Якщо з'являються бульбашки, вони можуть бути крихітними або розміром з гумку на кінчику олівця. Вони можуть викликати біль, свербіж або печіння. Якщо у вас з'явилися зазначені симптоми, негайно зверніться до свого лікаря або медсестри/медбрата для отримання правильного лікування.

Щойно ваша імунна система відновиться, вам почнуть вводити вакцини для дітей. Зазвичай це відбувається через 1 рік після трансплантації, але ваша бригада з трансплантації визначить терміни, що підійдуть саме

вам.

Ви можете вжити деяких заходів для зниження ймовірності розвитку інфекції. Нижче наведено рекомендації, яких слід дотримуватися. Ваша бригада з трансплантації може дати вам додаткові вказівки або внести зміни в ці рекомендації. Завжди дотримуйтесь вказівок своєї бригади з трансплантації.

Особиста гігієна

У період одужання після трансплантації дуже важливо підтримувати чистоту свого тіла. Це може допомогти уникнути інфекції. Дотримуйтесь наведених нижче інструкцій.

- Щодня приймайте душ або ванну.
 - Користуйтесь м'яким милом, наприклад Dove® або Caress®. Не використовуйте мило Ivory® чи мило-дезодорант. Воно може підсушувати шкіру.
 - Обов'язково мийте під пахвами та в паху.
 - Користуйтесь тільки особистою махровою серветкою та рушником.
 - Якщо у вас суха шкіра, не мийтесь занадто гарячою водою. Зволожуйте шкіру дитячим маслом або спеціальним засобом, наприклад

Eucerin® чи CeraVe®. Робіть це після купання, поки шкіра волога. Обережно промокніть шкіру насухо рушником. Не користуйтесь лосьйонами, що містять спирт. Вони сушать шкіру.

- Скоротіть час перебування під прямыми сонячними променями. Після трансплантації шкіра буде більш чутлива й може швидше обгоріти. Це також можуть погіршити ліки, які ви приймаєте.
 - Під час перебування на сонці завжди наносьте на шкіру сонцезахисний засіб із фактором SPF не нижче 30 одиниць. Час від часу повторюйте його нанесення.
 - Якщо ви плануєте перебувати під дією прямих сонячних променів протягом 20 хвилин або довше, прикривайте шкіру одягом із бавовни та надягайте сонцезахисний капелюх. Тривале перебування на сонці також може активувати герпетичну інфекцію (вірус простого герпесу).
- Вам можна носити контактні лінзи, але обов'язково переконайтесь в тому, що вони добре очищені, перед тим, як надіти їх. Не використовуйте розчин для очищення повторно. Обов'язково викидайте розчини для очищення після закінчення їхнього терміну придатності. У разі виникнення сухості очей використовуйте краплі для зволоження.

- Вам можна робити макіяж, але після трансплантації потрібно придбати нові косметичні засоби.
- У вас відростатимуть нові нігті замість старих. Це буде відбуватися поступово, впродовж 3-4 місяців після трансплантації. Поки ваша імунна система відновлюється, не робіть манікюр і педикюр у салоні краси. Ви можете робити це вдома самостійно власними інструментами.
- Якщо у вас ще стоїть тунельний катетер, не занурюйте його у воду під час приймання ванни. Для отримання додаткової інформації ознайомтеся з матеріалом *About Your Tunneled Catheter* (<https://sandbox18.mskcc.org/cancer-care/patient-education/about-your-tunneled-catheter>).
- Не робіть пірсинг чи татуювання на тілі після трансплантації. Це підвищує ризик зараження гепатитом та іншими інфекційними захворюваннями.

Зазвичай волосся починає відростати приблизно через 3 місяці після трансплантації. Нове волосся може мати іншу текстуру. Можливе випадіння волосся через місяці або роки після трансплантації, але це трапляється рідко.

Догляд за ротовою порожниною

Продовжуйте доглядати за порожниною рота так само, як ви робили це в лікарні. Співробітник вашої лікувальної команди скаже вам, коли можна почати користуватися зубною щіткою з найм'якішою щетиною. Це станеться тоді, коли абсолютна кількість нейтрофілів (absolute neutrophil count, ANC) у вашій крові перевищить 500 Виписка з лікарні після аутологічної трансплантації стовбурових клітин 5/21 (іноді цей показник виражаютъ значенням 0,5), а кількість тромбоцитів досягне 20 000 (іноді цей показник виражаютъ значенням 20) або перевищить це значення.

Запитайте у свого лікаря або стоматолога, коли вам можна починати користуватися зубною ниткою та звичайною зубною щіткою.

Якщо ви носите зубні протези, стежте за їхньою чистотою, щоб уникнути розвитку інфекції. Щодня замочуйте їх у будь-якому засобі для очищення зубних протезів. Робіть це згідно з інструкцією для застосування засобу. Потім добре промийте протези проточною водою. Можливо, після трансплантації вам доведеться підігнати протези.

Якщо серед прописаних вам ліків є ополіскувач для

ротової порожнини, зніміть протези, перш ніж полоскати рот таким засобом. Так ліки діятимуть ефективніше, що усуне ризик повторного розвитку інфекції в порожнині рота. Якщо ви відчуваєте біль або дискомфорт у роті, повідомте про це свого лікаря або медсестру/медбрата.

Впродовж 3-4 місяців після трансплантації, ба навіть довше, у вас може зберігатися відчуття сухості в роті. Не користуйтесь покупними ополіскувачами для порожнини рота на основі спирту чи перекису водню. Вони спричиняють сухість і подразнення в ротовій порожнині. Краще замість ополіскувача використовуйте слабкий сольовий розчин. Для його приготування змішайте:

- $\frac{1}{2}$ чайної ложки солі;
- $\frac{1}{2}$ чайної ложки харчової соди;
- 8 унцій (240 мл) води.

Ваш стоматолог може призначити інші засоби для полоскання. Вам також може допомогти розсмоктування цукерок або льодяніків, що не містять цукру.

Після трансплантації ваші слинні залози можуть не справлятися із завданням з очищення порожнини

рота від бактерій. Це збільшує ризик виникнення каріесу. Користуйтесь зубною пастою, що містить фтор. Тільки-но ротова порожнина повністю загоїться, та ви позбудетеся сухості в роті, можна починати також використовувати ополіскувач для ротової порожнини з фтором. Полосіть упродовж щонайменше 1 хвилини, а потім сплюньте. Не ополіскуйте рот водою.

Догляд за тунельним катетером

Підтримувати тунельний катетер у чистоті після виписки не менш важливо, ніж під час вашого перебування в лікарні. Якщо вас виписали зі встановленим тунельним катетером, медсестра/медбрать навчить вас, як доглядати за ним вдома. У вас буде можливість попрактикуватися в цьому під наглядом медсестри/медбрата.

Негайно зателефонуйте в офіс свого лікаря, якщо у вас:

- почевоніння, набряк або виділення навколо місця, де катетер виходить із вашого тіла;
- відпав безголковий з'єднувач;
- температура 100,4 °F (38,0 ° C) або вище чи озноб;
- зламався катетер, або щось витікає з нього;

- виникла незрозуміла проблема з катетером.

Умови вдома

- По змозі стежте за тим, щоб у дома не було бруду й пилу. Але не перестарайтесь. Наприклад, не потрібно перефарбовувати стіни чи міняти килими.
- Не варто перебувати там, де йдуть ремонтні або будівельні роботи, поки цього не дозволить ваша бригада з трансплантації. Це стосується робіт у процесі виконання й робіт, які були виконані за останні 3 місяці.
- Уникайте затхлих приміщень, де може рости пліснява, наприклад, сиріх підвалів. Ви можете встановити у дома систему фільтрації повітря, але це не обов'язково.
- **Не використовуйте зволожувач повітря.** Це сприятливе середовище для розмноження бактерій і зростання цвілі. Натомість взимку біля джерела тепла можна ставити ємність із водою. **Якщо ви вирішите вдатися до цього заходу, міняйте воду щодня.**
- В загалі, намагайтесь не займатися такими домашніми справами, як-от витирання пилу чи прибирання пилосмоком, упродовж 3 місяців після трансплантації. Залежно від самопочуття, вам

можна готувати їжу, мити посуд або прасувати.

- У вашій ванній кімнаті повинно бути дуже чисто, особливо це стосується ванни й унітазу. Слідкуйте за тим, щоб у ній регулярно проводилося прибирання з використанням засобів для дезінфекції. Найкраще було б, якби цей обов'язок виконував хтось інший.
- Ретельно мийте свої столові прибори та періть свої рушники й постільну білизну. Не потрібно робити це окремо від речей і білизни інших членів родини.
 - Ретельно мийте всі виделки, ложки й ножі гарячою водою із засобом для миття посуду чи користуйтеся для цього посудомийною машиною.
 - Періть рушники два рази на тиждень, а постільну білизну — один раз. Не користуйтеся рушниками та махровими серветками інших членів сім'ї, а тільки своїми власними.
- Ви можете мати вдома кімнатні рослини. Але впродовж перших декількох місяців після трансплантації:
 - торкайтесь землі в горщиках тільки в рукавичках і масці;
 - не торкайтесь води у вазі з квітами, нехай хтось інший щодня міняє її.

Домашні улюбленці

Домашні улюбленці можуть переносити хвороби. Через них у вас може підвищитися ризик зараження інфекційними захворюваннями в період, коли ваша імунна система ще відновлюється. У вашому будинку може жити улюбленець, і ви навіть можете його торкатися, але краще уникати близького фізичного контакту. Наприклад, не тримайте тварину в себе на колінах. Не чіпайте слину чи фекалії тварини. Бережіться укусів або подряпин.

У період відновлення не беріть у руки птахів, ящірок, змій, черепах, хом'ячків чи інших гризунів і не доглядайте за цими тваринами. Якщо у вас є акваріум і ви вимушенні чистити його самостійно, надіньте рукавички.

Якщо у вашому будинку живе кішка чи собака, дотримуйтесь наведених нижче додаткових рекомендацій, допоки ваш лікар не дасть вам інших вказівок.

- Слідкуйте за тим, щоби вашому улюбленцю вчасно робили щеплення та проводили повторну імунізацію.
- Щорічно звертайтеся до ветеринара для перевірки калу вашої тварини на наявність паразитів.

- Якщо у вас живе кішка, обстежуйте її щороку на наявність вірусу лейкозу котячих і токсоплазмозу.
- Обробляйте шкіру тварини від бліх. Слідкуйте за тим, щоби вашому улюбленню вчасно робили щеплення та проводили повторну імунізацію. Щорічно звертайтеся до ветеринара для перевірки калу вашої тварини на наявність паразитів.
- Не мийте котячі лотки та не прибирайте фекалії за своїм собакою. Нехай це робить за вас хтось інший.
- По змозі не відпускате улюбленців із будинку або за межі своєї ділянки. Так вони не підхоплять хвороби від інших тварин.
- Не дозволяйте улюбленцям лежати у вашому ліжку.
- На вулиці уникайте близьких контактів із тваринами на фермі чи в контактному зоопарку.

Якщо ви плануєте завести тварину після трансплантації, краще вибрати здорову собаку або кішку не молодше 1 року. Стерилізуйте або каструйте тварину.

Родичі та гості

Вам дозволяється мати тісний фізичний контакт із найближчими людьми Проте, не слід близько

контактувати з тими, хто застуджений, або в кого є ознаки хвороби. Надягайте маску, якщо вам вкрай потрібно знаходитися в одній кімнаті з хворою людиною. Ваші рідні та близькі друзі мусуть щорічно робити щеплення від грипу.

Ви можете приймати гостей, але лише невеликими групами. Не контактуйте з тими, хто:

- застуджений;
- хворіє на вітряну віспу;
- нещодавно міг заразитися вітряною віспою;
- нещодавно міг заразитися вірусом простого герпесу (що є причиною виникнення бульбашок герпесу на губах і на статевих органах);
- нещодавно міг заразитися оперізувальним герпесом;
- нещодавно міг заразитися іншим вірусом або інфекцією;
- нещодавно пройшов вакцинацію з використанням живої противірусної вакцини, зокрема проти вітряної віспи чи ротавірусу. Існує кілька таких вакцин, тож якщо одна з них потрібна комусь із ваших близьких, повідомте їхніх лікарів про те, що ви живете разом, і ваша імунна система зараз у

пригніченому стані.

Якщо ви або хтось із ваших родичів могли заразитися вітряною віспою, оперізувальним герпесом, кором або краснуху, негайно повідомте про це свого лікаря.

Поза домом

Регулярно виходьте на прогулянки, однак уникайте забруднених місць і будівельних майданчиків.

Прогулянки пішки — це чудовий спосіб відновити сили та поліпшити витривалість. Проте, у перші місяці після трансплантації уникайте наведених нижче місць, коли там багатолюдно:

- супермаркетів;
- торговельних центрів;
- кінотеатрів;
- шкіл;
- ресторанів;
- громадського транспорту;
- місць поклоніння (зокрема церков, синагог і мечетей).

Ви можете відвідувати ці місця в ті години, коли там не так багатолюдно.

Не користуйтеся громадським транспортом (наприклад, поїздами або автобусами) бодай 3 місяці після трансплантації. Ми розуміємо, що вам може знадобитися таксі, послуги з перевезення пасажирів чи інший транспорт, наприклад замовлений в організації Access-a-Ride, щоби приїжджати на візити подальшого спостереження. Під час використання цих видів транспорту ми рекомендуємо вам надягати маску.

Купатися в океані можна лише після відновлення сил та рівня активності. Звертайте увагу на попередження, які робить місцеве управління охорони здоров'я. Ви також можете купатися в приватному басейні, якщо людей у ньому не дуже багато. Вода в ньому має бути хлорованою. Не купайтесь в озерах, річках, громадських і багатолюдних басейнах доти, доки не відновиться ваша імунна система. **Не плавайте із тунельним катетером.**

Ваш лікар повідомить вам, коли частково чи повністю закінчаться ці обмеження.

Кровотеча

Тромбоцити — це клітини крові, що допомагають утворювати згустки й зупиняти кровотечу. Коли

кількість тромбоцитів знижена, існує ризик кровотечі. Це не завадить виписати вас із лікарні. Можливо, пройдуть тижні або місяці, перш ніж ваш організм почне виробляти нормальну кількість тромбоцитів. Вам може знадобитися переливання тромбоцитів.

Ознаками зниження кількості тромбоцитів є зміни шкіри, кровотеча або одночасна поява цих двох симптомів. Такі зміни шкіри — це зокрема поява множинних синців або петехій. Це крихітні пурпурно-червоні точки на шкірі, які не зникають при натисканні. Ви можете побачити їх на гомілках або з внутрішньої сторони щиколоток. Іншим симптомом зниженої кількості тромбоцитів може бути кровотеча ясен або кров з носа.

Якщо на момент виписки з лікарні у вас спостерігався якийсь із цих симптомів, а його інтенсивність або частота виникнення збільшилася, зателефонуйте своєму лікарю. Зателефонуйте лікарю, якщо у вас не було цих симптомів, але раптом вони з'явилися. Це може означати зміну кількості тромбоцитів.

Якщо ви отримали травму, що спричинила кровотечу, не панікуйте. Зберігайте спокій і дотримуйтесь

наведених нижче рекомендацій для вашого типу травми.

- **Відкриті рани:** якщо ви порізалися, закройте місце порізу чистою та сухою марлевою серветкою, рушником або тканиною. Щільно притисніть. Не відпускати до зупинення кровотечі. Якщо кров не зупиняється, піdnіміть уражену частину тіла. Наприклад, піdnіміть руку або підкладіть щось під ступню. Прикладіть до рани лід і зателефонуйте своєму лікарю.
- **Носові кровотечі:** якщо з вашого носа тече кров, сядьте й трохи нахиліться вперед. Не закидайте голову назад. Щільно затисніть перенісся великим і вказівним пальцями, тримаєте та не відпускати не менш 10 хвилин. Якщо кровотеча не зупинилася, продовжуйте затискати ніс. Покладіть на верхню частину носа невеликий пакетик із льодом і тримайте, поки кровотеча не припиниться. Якщо кровотеча не припиняється більш як 30 хвилин, зателефонуйте своєму лікарю.
- **Аварії:** якщо ви раптом потрапили в аварію, вам може знадобитися кров або препарати крові. Вони мають бути оброблені дозою випромінювання в 3000 рад. Це необхідно для того, щоби використовувана при переливанні кров не

спричинила реакції відторгнення транспланта (Graft-versus-host disease, GvHD).

- Завжди носіть аксесуар MedicAlert. Завдяки йому лікар, який буде вас лікувати, отримає необхідну інформацію.
- Якщо ви потрапили до іншої лікарні, попросіть лікаря одразу зателефонувати в центр Memorial Sloan Kettering (MSK) і отримати рекомендації щодо препаратів крові.

Якщо кількість тромбоцитів у вашій крові становить менш як 50 000 (50) дотримуйтесь наведених нижче рекомендацій.

- Голіться електробритвою.
- Користуйтесь зубною щіткою з м'якою щетиною або ополіскувачем для порожнини рота, наприклад, WaterPic® для запобігання кровоточивості ясен. Не використовуйте зубну нитку.
- Не приймайте aspirin, препарати, що містять aspirin, і нестероїдні протизапальні препарати (nonsteroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs), зокрема ibuprofen (Advil®) або naproxen (Aleve®). Для отримання додаткової інформації прочитайте розділ «Найпоширеніші ліки, яких слід уникати».

- Ви можете сякатися, але не прикладайте при цьому великих зусиль.
- Якщо у вас запор, зателефонуйте своєму лікарю. Можливо, вам потрібно додати до раціону продукти з високим вмістом клітковини чи приймати проносний засіб.
- Уникайте занять або видів спорту, що можуть привести до травм. Якщо у вас є питання або сумніви щодо цього, поговоріть зі своїм лікарем.

Повернення до звичного способу життя

Повсякденні справи

Тривалість періоду одужання після трансплантації може бути різною. Зазвичай потрібно приблизно 3 місяці, але цей строк може бути трохи меншим або більшим, що також нормально.

У період після трансплантації відбувається відновлення та зростання клітин. Усі клітини в ротовій порожнині, у шлунку, кишківнику, волоссі та м'язах ростимуть заново. Для цього необхідні калорії та енергія. Ви можете втомлюватися швидше, ніж очікували. Пам'ятайте, що слабкість і втома — це нормальнé явище. З кожним тижнем ви будете почуватися енергійніше.

Приблизно на третьому місяці після трансплантації ваше волосся почне рости швидше. Ви можете почуваєтися почуваєтись досить добре, щоби поступово повернатися до звичайного рівня активності. З цього моменту стан вашого здоров'я, імовірніше, буде постійно поліпшуватися. Проте, зазвичай організм лише починає відновлюватись впродовж перших 2–3 місяців після трансплантації, та цей процес займає близько 1 року.

Фізичні навантаження

Ймовірно, для відновлення сил вам буде потрібен час. Можливо вам слід дотримуватися регулярного розкладу фізичних навантажень. Починайте виконувати легкі вправи. Ваш фізіотерапевт допоможе вам визначити, який тип вправ вам підходить. Коли відчуєте готовність, спітайте лікаря, як збільшити фізичне навантаження.

Не займайтесь контактними видами спорту й не катайтесь на лижах, поки кількість тромбоцитів не перевищить 100 000 (100). Не плавайте, якщо вам ще не зняли тунельний катетер, встановлений в ділянці грудної клітки.

Хобі

Деякі захоплення, зокрема робота по дереву,

живопис і моделювання, допускають використання матеріалів, які можуть бути токсичними. Завжди працюйте в приміщенні, що добре вентилюється. Залишайте вікна відкритими. Використовуйте нетоксичні фарби та клей. Якщо у вас є питання або сумніви щодо повернення до своїх захоплень, проконсультуйтесь зі своїм лікарем.

Повернення до навчання або роботи

Ви зможете повернутися до навчання або вийти на роботу не раніше ніж через 2-4 місяці після трансплантації. Цей термін індивідуальний і залежить від багатьох факторів.

Ви можете почуватися готовим повернутися або ж хвилюватися через повернення після тривалої відсутності. Можливо, вам варто робити це поступово. Наприклад, почніть із неповного робочого дня або 3-денноого робочого тижня. За словами більшості пацієнтів, думати про повернення їм було майже так само важко, як пережити цей перший день.

Процес повернення до звичного способу життя може бути непростим. Пройде деякий час, доки ви звикнете до змін у своїй зовнішності. Наприклад, більшість людей дуже важко переживають втрату волосся. Або ж у вас можуть виникнути проблеми з

концентрацією чи тривалістю зосередження уваги. Можливо, ви вже не зможете жити в звичному ритмі. Ви можете обговорити питання повернення до навчання або роботи з фахівцями своєї бригади з трансплантації. Ви також можете проконсультуватися з соціальним працівником, медсестрою/медбрратом, психіатром або своїм лікарем. Спільними зусиллями ми знайдемо спосіб, як полегшити для вас цей перехідний період.

Подорожі

Впродовж перших 3 місяців після трансплантації залишайтесь на відстані не більше 1 години їзди до центру MSK.

Якщо ви плануєте подорожувати літаком, проконсультуйтесь зі своєю бригадою з трансплантації. Для безпечноого перельоту у вас має бути достатня кількість тромбоцитів.

Якщо ви плануєте виїжджати за межі країни протягом перших 2 років після трансплантації, обговоріть це зі своєю бригадою з трансплантації. Для зниження ризику інфікування під час перебування за кордоном і залежно від пункту призначення вам можуть порекомендувати відвідати фахівця з медицини подорожей.

Сексуальне здоров'я

Перед випискою з лікарні поговоріть зі своїм лікарем про відновлення статевої активності. Дуже важливо, щоб ви разом із партнером отримали відповіді на всі ваші питання. Ви також можете поставити додаткові запитання на візиті подальшого спостереження, якщо треба.

Захист під час статевого акту

Допоки ваш лікар не скаже вам, що ваша імунна система та кількість клітин крові відновилися, дотримуйтесь таких правил безпеки:

- Поки кількість тромбоцитів не сягне 50 000 (50), не займайтесь сексом, що передбачає проникнення чи контакт зі слизовими оболонками. Йдеться про вагінальний, оральний і анальний секс або введення пальців, вібраторів чи інших сексуальних іграшок у піхву чи анальний отвір.
- Користуйтесь латексними презервативами під час вагінального, орального або анального сексу. Якщо у вас алергія на латекс, зверніться до свого медичного працівника. Пам'ятайте, що вам не рекомендується займатися вагінальним, оральним або анальним сексом, та взагалі сексом із проникненням, допоки кількість тромбоцитів не

сяgne 50 000 (50).

- Користуйтеся захисними засобами (презервативами чи зубними захисними прокладками), якщо вагінальні виділення або сперма партнера можуть потрапити вам у рот.
- Уникайте статевих актів, де може бути контакт фекалій із вашою ротовою порожниною.
- Не займайтесь сексом, що передбачає контакт зі слизовими оболонками, за наявності у вас або вашого партнера статової інфекції чи при підозрі на її наявність.
- Користуйтеся протизаплідними засобами (контрацептивами), щоб не завагітніти. Якщо в майбутньому ви хочете завагітніти, проконсультуйтесь зі своїм лікарем.

Обіймати та притискати до себе партнера, ніжно торкатися один до одного й ціluвати шкіру — ось найкращі способи підтримувати інтимні стосунки в цей період. Для отримання додаткової інформації про те, як вести статеве життя під час і після лікування, ознайомтеся з такими матеріалами MSK:

- *Sex and Your Cancer Treatment*
(<https://sandbox18.mskcc.org/cancer-care/patient-education/sex-cancer-treatment>)

- *Sexual Health and Intimacy*
(<https://sandbox18.mskcc.org/cancer-care/patient-education/sexual-health-and-intimacy>)

Ви можете ознайомитися з цими матеріалами в Інтернеті або попросити їх у медсестри/медбрата.

Американське онкологічне товариство (American Cancer Society, ACS) також має інформаційні матеріали з питань статевого життя після лікування раку. Їх можна отримати безкоштовно в місцевому відділенні ACS або на вебсайті товариства за наведеними нижче посиланнями.

- [*«Секс і чоловік із раком»*](#)
- [*«Секс і жінка з раком»*](#)

Інформація для жінок

Після трансплантації у вас:

- може порушитися менструальний цикл;
- можуть взагалі припинитися менструації;
- може виникнути сухість і дискомфорт у піхві та вульві (зовнішніх статевих органах).

Усути сухість і дискомфорт у піхві та вульві можна за допомогою вульвовагінальних зволожувальних засобів. Вони не містять гормонів, їх можна придбати

без рецепта в більшості аптек або через Інтернет. Зокрема це капсули з вітаміном Е, Replens, Hyalo GYN і LIQUIBEADS торгової марки K-Y. Перед використанням цієї продукції проконсультуйтесь зі своїм лікарем із трансплантації кісткового мозку.

Лубриканти для статевих актів зазвичай випускаються у формі рідин або гелів. Вони використовуються на додаток до рідини, що виробляється природньо у піхві, для зняття сухості та болісних відчуттів під час статевого акту. Ви можете використовувати їх для отримання більшого комфорту та задоволення під час сексу. Наприклад, це Astroglide®, K-Y Jelly, Pjur® Woman і Bodyglide (лубрикант на основі силікону). Для отримання додаткової інформації прочитайте матеріал *Improving Your Vulvovaginal Health* (<https://sandbox18.mskcc.org/cancer-care/patient-education/vaginal-health>). Перед використанням цієї продукції проконсультуйтесь зі своїм лікарем із трансплантації кісткового мозку.

Ваше лікування може вплинути на функціонування яєчників. У результаті може знизитися рівень естрогену. Після трансплантації ваш лікар може порекомендувати вам приймати добавки з естрогеном.

Якщо вам необхідна допомога чи підтримка щодо цього, ваш лікар може направити вас до фахівця Програми з питань сексуальної медицини та здоров'я жінок (Female Sexual Medicine and Women's Health Program). Ви також можете безпосередньо зателефонувати в цю програму за номером 646-888-5076.

Інформація для чоловіків

Після трансплантації у вас може спостерігатися зниження статевого потягу. Це може вплинути на ваші стосунки. Однак із відновленням сил і підвищенням рівня активності ваш сексуальний потяг також має посилюватися.

Крім того, після трансплантації у вас може виникнути еректильна дисфункція (erectile dysfunction, ED). Для її лікування можна застосовувати ліки, як-от sildenafil citrate (Viagra®) або tadalafil (Cialis®). Існує багато інших способів лікування ED.

Якщо вам необхідна допомога або підтримка щодо цього, ваш лікар може направити вас до фахівця нашої Програми з питань сексуального здоров'я та репродуктивної медицини для чоловіків (Male Sexual and Reproductive Medicine Program). Ви також можете безпосередньо звернутися в цю програму за

номером 646-888-6024.

Вживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Після трансплантації вашим органам знадобиться деякий час, щоб відновитися. Алкоголь може завдати шкоди вашій печінці та процесу відновлення кісткового мозку. Ця шкода може бути більшою, якщо ви приймаєте ліки, що впливають на роботу печінки. Не вживайте алкоголь доти, доки ваш лікар не скаже вам, що це безпечно.

Не куріть:

- сигарети;
- сигари;
- марихуану;
- інші тютюнові вироби.

Недотримання цих рекомендацій може привести до серйозних уражень легень. Це також може підвищити ризик повторного розвитку раку. Якщо ви не можете самостійно відмовитися від куріння, зверніться до фахівців Програми лікування тютюнової залежності центру MSK (MSK Tobacco Treatment Program) за номером 212-610-0507 або через вебсайт: www.mskcc.org/cancer-care/counseling

[support/tobacco-treatment.](#)

Подальше спостереження

Перш ніж вас випищуть із лікарні, для вас буде складено графік візитів із метою подальшого спостереження. Ваш лікар вирішить, як часто вам потрібно приходити на такі візити. Якщо ви почуватиметеся добре, їх призначатимуть рідше.

Створення облікового запису MyMSK допоможе вам стежити за часом відвідувань, що призначаються в межах подальшого спостереження. MyMSK — це портал для пацієнтів центру MSK. Це ваша особиста вебсторінка, де розміщується інформація про призначенні вам зустрічі з лікарем, викладаються результати лабораторних і променевих досліджень, а також є можливість спілкуватися зі вашою лікувальною командою. Щоб отримати допомогу в налаштуванні облікового запису MyMSK, подивітесь відеоролик *How to Enroll in MyMSK: Memorial Sloan Kettering's Patient Portal* (<https://sandbox18.mskcc.org/cancer-care/patient-education/video/how-enroll-mymsk-patient-portal>).

Що взяти із собою

На візит подальшого спостереження візьміть із собою список усіх ліків, які ви приймаєте, зокрема

пластирів та мазей, із зазначенням усіх дозувань. Складіть список ліків, на які потрібно виписати повторний рецепт. Якщо якісь ліки у вас закінчаться до того, як ви прийдете на візит, заздалегідь повідомте про це свого лікаря. На візиті до лікаря вам випишуть рецепти, за якими ви можете придбати ліки в центрі MSK або у своїй найближчій аптекі.

Не зайвим буде також взяти із собою перелік питань, що виникли у вас з моменту останнього візиту.

Чого варто очікувати

Ви здасте кров на аналіз, щоб визначити кількість клітин крові, вміст електролітів, а також перевірити функцію печінки та нирок. Ваш лікар скаже, чи потрібно вам робити пункцию кісткового мозку, та якщо треба, то коли.

Можливо, вам призначать лікування, що передбачає внутрішньовенне (в/в) введення, зокрема введення антибіотиків і переливання крові. У цьому разі лікар або медсестра/медбррат скажуть вам, як довго та як часто ви маєте проходити ці процедури. Вони зазвичай призначаються на дні візитів для подальшого спостереження.

Вакцини та імунізація

Після трансплантації ви втратите той захист, який

давали вам зроблені в дитинстві щеплення. Отже, одразу після відновлення вашої імунної системи вам потрібно знову провести педіатричну вакцинацію. Зазвичай це відбувається приблизно через 1 рік після трансплантації.

Ваша бригада з трансплантації організує вакцинацію, тільки-но це буде безпечно, або ж вас спрямують до медсестри/медбрата вищої кваліфікації в нашу Клініку імунізації (Immunization Clinic). Щеплення можна зробити в центрі MSK, або ж медсестра/медбрать вищої кваліфікації передадуть список рекомендованих щеплень вашому основному лікареві. Іноді терапевтам складно діставати необхідні вакцини, тож, можливо, вам доведеться отримати їх у центрі MSK.

Догляд за зубами

Після одужання від трансплантації, регулярно відвідуйте стоматолога за місцем проживання. Якщо вам потрібна серйозна стоматологічна допомога, попросіть свого стоматолога зателефонувати стоматологу центра MSK за номером 212-639-7644 перед початком лікування. Ваш лікар-трансплантолог скаже вам, коли можна знову почати лікуватися у вашого стоматолога.

Повідомте свого лікаря або стоматолога, якщо:

- ви приймали ліки pamidromate (Aredia) або zoledronic acid (Zometa);
- у вас є скутість нижньої щелепи;
- ви відчуваєте зубний біль;
- у вас спостерігається втрата природного забарвлення зубів близче до краю ясен.
- у вас є відкладення ясен.

Перевірка зору

Якщо ви проходили радіотерапію або приймали стероїди у великих дозах, у вас може розвинутися катаракта. Зверніться до лікаря-офтальмолога, якщо у вас є будь-який із цих симптомів:

- зір став неясним, нечітким, розмитим або затуманеним;
- змінилося сприйняття кольору;
- вам важко керувати автомобілем увечері, наприклад, вас сліплять фари зустрічних машин;
- з'явилася чутливість до яскравого світла вдень;
- двоїтесь в очах.

Можливо, вам буде достатньо змінити окуляри чи контактні лінзи. Обов'язково розкажіть фахівцю з

оптики або офтальмологу про минуле лікування.

Перш ніж брати рецепт на нові окуляри, зачекайте не менше 3 місяців, адже гострота зору може змінюватися під час відновного періоду.

Найпоширеніші ліки, вживання яких слід уникати

Не приймайте aspirin, ліки, що містять aspirin, і нестероїдні протизапальні препарати (nonsteroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs), до отримання відповідного дозволу від свого лікаря. Список цих ліків викладено в матеріалі *How To Check if a Medicine or Supplement Has Aspirin, Other NSAIDs, Vitamin E, or Fish Oil*

(<https://sandbox18.mskcc.org/cancer-care/patient-education/common-medications-containing-aspirin-and-other-nonsteroidal-anti-inflammatory-drugs-nsaids>).

Якщо збираєтесь приймати безрецептурні препарати, прочитайте інструкції щодо їхнього застосування, щоб перевірити, чи не містять ці ліки речовин, яких вам треба уникати. У разі сумнівів щодо безпечності приймання конкретних ліків, проконсультуйтесь з фахівцями вашої бригади з трансплантації.

Не приймайте рослинні добавки або домашні

лікувальні засоби, не порадившись із фахівцями своєї бригади з трансплантації.

Джерела інформації

Ресурси MSK

Вебсайт освітніх матеріалів для пацієнтів і осіб, які за ними доглядають (Patient & Caregiver Education)

www.mskcc.org/pe

Відвідайте вебсайт освітніх матеріалів для пацієнтів і осіб, які за ними доглядають, де можна відшукати потрібні матеріали у віртуальній бібліотеці. Там ви знайдете друковані матеріали, відеозаписи та онлайн-програми.

Програма з питань сексуальної медицини та здоров'я для жінок

646-888-5076

Зателефонуйте за цим номером, щоб отримати інформацію з питань, пов'язаних із сексуальною функцією жінок.

Програма з питань сексуального здоров'я та репродуктивної медицини для чоловіків

646-888-6024

Зателефонуйте за цим номером, щоб отримати інформацію з питань, пов'язаних із сексуальною

функцією чоловіків.

**Програма лікування тютюнової залежності
центру MSK (MSK Tobacco Treatment Program)**
212-610-0507

Зателефонуйте за цим номером, щоб отримати інформацію про відмову від куріння або вживання інших тютюнових виробів.

**Служба стоматологічної допомоги центру MSK
(MSK Dental Service)**

212-639-7644

Зателефонуйте та проконсультуйтесь зі стоматологом центру MSK перед початком серйозного стоматологічного лікування за місцем проживання.

Зовнішні ресурси

Аксесуари MedicAlert

www.medicalert.org

Відвідайте вебсайт, щоб отримати інформацію про аксесуари MedicAlert, зокрема браслети та кулони.

**Американське онкологічне товариство
(American Cancer Society, ACS)**

www.cancer.org

800-227-2345 (800-ACS-2345)

Відвідайте їхній вебсайт, щоб отримати загальну інформацію про рак. Ви також можете їм

зателефонувати та запросити друковані примірники буклетів «Секс і жінка з раком» (*Sex and the Adult Female With Cancer*) або «Секс і чоловік із раком» (*Sex and the Adult Male With Cancer*).

У разі виникнення питань зверніться безпосередньо до співробітника своєї медичної бригади. Пацієнти MSK можуть телефонувати постачальнику медичних послуг після 17:00, у вихідний або свяtkовий день за номером 212-639-2000.

Додаткову інформацію див. у нашій віртуальній бібліотеці за посиланням www.mskcc.org/pe.

Returning Home After Your Autologous Stem Cell Transplant -
Last updated on July 20, 2023

Усі права збережені та належать Memorial Sloan Kettering Cancer Center