



مریض اور نگران کے لیے تعلیم

# آپ کی اپر اینڈوسکوپی کے بارے میں

یہ معلومات آپ کو بالائی اینڈوسکوپی کے لیے تیار ہوں گے اپر اینڈوسکوپی آپ کی غذائی نالی (کھانے کی نالی)، معدہ، اور آپ کی چھوٹی آنت کے پہلے حصہ کو دیکھنے کے لیے ایک ٹیسٹ

ہے۔

آپ کی اپر اینڈوسکوپی کے دوران، آپ کا یہی کیئر فرائم کنندہ ایک لچکدار ٹیوب استعمال کرے گا جسے اینڈوسکوپ کہتے ہیں اس سے وہ ایک ویدیو اسکرین پر آپ کی غذائی نالی، معدہ، اور چھوٹی آنت کے اندر دیکھ سکتے ہیں وہ ٹشو کا چھوٹا نمونہ بھی لے سکتے ہیں یا ایک ابھری ہوئی رسولی (ٹشو کی افزائش) کو ختم کر سکتے ہیں اس طبی عمل کو با یوپسی کے جاتا ہے۔

## آپ کے طبی عمل سے 1 ہفتہ پہلے

### اپنی دوائیوں کے بارے میں پوچھیں

آپ کو اپنے طبی عمل سے پہلے اپنی کچھ ادویات کو لینا رونکا پڑ سکتا ہے اپنے ڈاکٹر سے اس بارے میں بات کریں کہ کون سی دوائیوں کا استعمال بند کرنا آپ کے لیے محفوظ ہے مگر نہ ذیل میں چند عمومی مثالیں دیے گئے ہیں۔

### (خون پتلا کرنے والی) Anticoagulants

اگر آپ خون پتلا کرنے والی دوا (جو آپ کے خون کے جمنے کے طریقے کو متاثر کرتی ہے) لیتے ہیں تو آپ کا طبی عمل انجام دینے والے یہی کیئر فرائم کنندہ سے پوچھیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے وہ آپ کو دوا روکنے کی تجویز دے سکتے ہیں اس کا انحصار آپ کے کیہاں والے طبی عمل کی نوعیت اور آپ کی جانب سے خون پتلا کرنے والی دوا لینے کی وجہ پر ہوگا۔

عام خون پتلا کرنے والوں کی مثالیں ذیل میں درج ہیں اور بھی ہیں، اس لیے یقینی بنائیں کہ آپ کی دیکھ بھال کرنے والی ٹیم کو وہ تمام ادویات معلوم ہیں جو آپ لیتے ہیں اپنی دیکھ بھال کرنے والی ٹیم کے ممبر سے بات کیے بغیر اپنا خون کو رقیق کرنے کی دو ابند نہ کریں۔

میلوکسیکیم (موبک®)

نان سٹرائیڈل اینٹی سوزش آلی دوائیاں (این

اپیکسابان (ایلیکوس®)

ایسپرین



- ایس اے آئی ڈیز)، جیسا کے آئیوبیوروفین (ایڈویل<sup>®</sup>، موٹرن<sup>®</sup>) اور نیپروکسن (ایلیو<sup>®</sup>)
- پینٹوکسفیلین (ٹرینٹل<sup>®</sup>)
- پراسوگریل (ایفینٹ<sup>®</sup>)
- ریواروکسابان (زیرلٹو<sup>®</sup>)
- سلفاسالازین (اژولفیدین<sup>®</sup>، سلفازین<sup>®</sup>)
- ٹکاگریلر (برلٹا<sup>®</sup>)
- ٹنزاپرین (انوھیپ<sup>®</sup>)
- وارفرین (جانٹووین<sup>®</sup>، کوماڈین<sup>®</sup>)
- سیلیکوکسپ (سیلبریکس<sup>®</sup>)
- سیلوسٹازول (پلیٹل<sup>®</sup>)
- کلوبیڈوگریل (پلاویکس<sup>®</sup>)
- ڈبیگٹران (پراڈاکسا<sup>®</sup>)
- ڈالٹیپرین (فریگمین<sup>®</sup>)
- ڈپریڈمول (پرسنٹائن<sup>®</sup>)
- ایڈوکسابان (ساویسا<sup>®</sup>)
- اینوکسپارن (لووینکس<sup>®</sup>)
- فونڈاپارینکس (آریکسٹرا<sup>®</sup>)
- ہیپارن (آپ کی جلد کے اندر شات)

## ذیابیطس کی ادویات

ممکن ہے آپ ذیابیطس کے لیے انسولین یا کوئی اور ادویات لے رہے ہوں گے آپ کو دوا کی تجویز دینے والا ہیلٹھ کیئر فرائم کنندہ سے پوجھیں کہ آپ کو اپنے طبی عمل والا دن کی صبح کیا کرنا چاہیے ہے وہ سکتا ہے کہ آپ کو طبی عمل سے پہلے اپنی ادویات کی خوراک تبدیل کرنی پڑے گے۔

اپنے طبی عمل سے ایک دن پہلے یا اُسی دن metformin (جیسے کہ Glucophage<sup>®</sup> یا Janumet<sup>®</sup>) زمین یا کوئی بھی ایسی دوا نہ لیں جس میں metformin (جیسے کہ Janumet<sup>®</sup>) شامل ہو۔

## اگر آپ کو AICD ہے تو اپنے ہیلٹھ کیئر فرائم کنندہ کو بتائیں

اگر آپ کو آٹومیٹک امپلانٹیبل کارڈیوورٹر ڈیفبریلیٹر (AICD) ہے تو اپنے MSK ہیلٹھ کیئر فرائم کنندہ کو بتائیں۔ اگر آپ کو AICD ہے تو آپ کو اپنا طبی عمل MSK کے مرکزی اسپتال، میموریل اسپتال میں کروانا ہوگا۔

## اگر ضرورت ہے تو اپنے ڈاکٹر سے ایک مراسلہ حاصل کریں

- اگر آپ کو آٹومیٹک امپلانٹیبل کارڈیوورٹر ڈیفبریلیٹر (AICD) ہے تو آپ کو اپنے طبی عمل سے پہلے اپنے کارڈیولو جسٹ (دل کے ڈاکٹر) سے ایک کلینرنس لیٹر لینا ہو گا۔ کلینرنس لیٹر وہ مراسلہ ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ بغیر کسی خطرہ کے طبی عمل کروا سکتے ہیں۔
- اگر آپ کو گزشتہ 6 میں درد، سرچکرائے، سانس لینے میں مشکل، یا بے

وشاہی کا سامنا ہوا ہو، تو آپ کہاں ڈاکٹر کو آپ کا معائنہ کرنا ہوگا، اور اپنے طبی عمل سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ایک کلینیکس لیٹر لینا ہوگا۔

آپ کے MSK ڈاکٹر کے دفتر میں آپ کا کلینیکس لیٹر آپ کے طبی عمل سے کم از کم 1 دن پہلے لازماً پہنچ جانا چاہیے۔

## کسی کو آپ کہاں کا انتظام کریں؟

آپ کے پاس ایک ذمہ دار کیئر پارٹنر ہونا چاہیے جو آپ کے پروسیجر کے بعد آپ کو گھر لے جائے۔ ایک ذمہ دار کیئر پارٹنر وہ توہین ہے جو آپ کو محفوظ طریقے سے گھر پہنچنے میں مدد کر سکتا ہے اگر انہیں کوئی تشویش ہے تو وہ آپ کی کیئر ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنے پروسیجر کے دن سے پہلے اس کی منصوبہ بندی کو یقینی بنائیں۔

اگر آپ کو گھر لے جانے کے لیے آپ کے پاس کوئی ذمہ دار کیئر پارٹنر نہیں ہے، تو نیچے دی گئی ایجنسیوں میں سے کسی ایک کو کال کریں وہ آپ کے ساتھ گھر جانے کے لیے کسی کو بھیجن گے اس سروس کے لیے ایک چارج ہے، اور آپ کو ٹرانسپورٹ فراہم کرنے کی ضرورت ہو گئی ہے کیسی یا کار سروس استعمال کرنا ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی آپ کو اپنے ساتھ ایک ذمہ دار کیئر پارٹنر کی ضرورت ہے۔

نیو جرسی میں ایجنسیاں

دیکھ بھال کرنے والے لوگ: 4649-227-877

نیو یارک میں ایجنسیاں

VNS یا لیٹر: 888-735-735

دیکھ بھال کرنے والے لوگ: 4649-227-877

## آپ کے طبی عمل سے 3 دن پہلے

ایک اینڈوسکوپی نرس آپ کے طبی عمل سے 3 دن پہلے صبح 8 بجے سے شام 6 بجے کے درمیان آپ کو کال کرنے گا/گی وہ آپ کے ساتھ اس گائیڈ میں درج ہدایات کا جائزہ لے گا/گی اور آپ سے آپ کے سابقے طبی ریکارڈ کے متعلق سوالات پوچھے گا/گی نرس آپ کی ادویات کا بھی جائزہ لے گا/گی وہ آپ کو بتائے گا/گی کہ اپنے طبی عمل کے دن کی صبح کو نسی ادویات لینی ہیں۔

از ہیں درج کرنے کے لیے ذیل میں دی گئی جگہ استعمال کریں۔

## آپ کے طبی عمل سے ایک دن پہلے

# پروسیجر کا وقت نوٹ کریں

ایک اسٹاف ممبر آپ کے طبی عمل سے ایک دن پہلے دوپہر 12 بجے کے بعد آپ کو کال کرنا گا اسٹاف ممبر آپ کو بتائے گا کہ آپ کو اپنے طبی عمل کے لیے کس وقت پہنچ جانا چاہیے اگر آپ کا طبی عمل پہر کے دن طے ہو، تو وہ آپ کو دو دن پہلے جمعہ کو کال کرنا گا اگر آپ کو کال نہ آئے، تو اپنے یلتھ کیئر فراہم کنندہ کے دفتر میں کال کریں

اگر آپ کو اپنا طبی عمل منسوخ کروانا ہو، تو اسے یلتھ کیئر فراہم کنندہ کو کال کریں جس نے اسے آپ کے لیے طے کیا تھا

## کھانے کے لئے ہدایات



اپنی سرجری سے پہلے رات کو آدھی رات (12 بجے) کھانا بند کر دینے اسے میں سخت ٹافی اور گم شامل ہیں۔

اگر آپ کے یلتھ کیئر فراہم کنندہ نہ آپ کو آدھی رات سے پہلے کھانا بند کرنے کو کہاں تو ان کی ہدایات پر عمل کریں کچھ لوگوں کو اپنی سرجری سے پہلے زیادہ دن خالی پیٹ رہنے کی ضرورت ہوتی ہے (کھانا نہیں)

## آپ کے پروسیجر کا دن

### پانی پینے کی ہدایات

آدھی رات کے درمیان (12 بجے رات) اور اپنی آمد کے وقت سے 2 گھنٹے پہلے، صرف نیچے دی گئی فہرست میں موجود مشروبات پئیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہ کھائیں یا پئیں اپنی آمد سے 2 گھنٹے قبل پانی پینا بند کر دینے

● پانی

● سیب کا شفاف جوس، انگور کا شفاف جوس، یا کریں بیری کا شفاف جوس

● Powerade یا Gatorade

● سیا کافی یا سادہ چائے چینی شامل کرنا ٹھیک ہے اس کے علاوہ کچھ بھی شامل نہ کریں  
○ کسی بھی قسم کے دودھ یا کریمر کی کوئی سی بھی مقدار شامل نہ کریں اس میں نباتات پر مبنی دودھ اور کریمرز شامل ہیں

○ شدہ مت شامل کریں

○ ذائقہ دار سیرپ مت شامل کریں

اگر آپ کو ذیابیطیس، تو ان مشروبات میں چینی کی مقدار پر توجہ دیں اگر آپ شوگر فری، کم شوگر کے حامل، یا بنا شوگر شامل کئے ان مشروبات کے ورژن شامل کرتے ہیں تو آپ کے بلڈ شوگر لیولز کو قابو میں رکھنا آسان ہو جائے گا۔

سرجری سے قبل پانی کی کمی پوری رکھنا مددگار ہوتا ہے، لہذا اگر آپ کو پیاس لگی تو پانی پی لیں اپنی ضرورت سے زیاد پانی مت پئیں آپ کو اپنی سرجری کے دوران نسou میں داخل کئے جائے والے سیال (IV) دئیں جائیں گے۔



اپنی آمد کے وقت سے 2 گھنٹے قبل پانی پینا بند کر دیں اس میں پانی شامل ہے۔

## ام باتیں

- صرف وہی ادویات لیں جن میں آپ کے یلٹھ کیئر فرائم کنندہ نہ آپ کو آپ کے طبی عمل کی صبح لینے کو کہا تھا اذکر میں چند گھونٹ پانی کے ساتھ لیں۔
- کوئی بھی لوشن، کریم، پاؤڈر، میک اپ، پرفیوم یا کلوں استعمال نہ لگائیں۔
- کوئی بھی جیولری، بشمول جسم پر کھدوائی کوئی چیزیں اتار لیں۔
- قیمتی چیزیں (جیسے کہ کریڈٹ کارڈ اور جیولری) کو گھر پر ہی چھوڑ جائیں۔
- اگر آپ کا نیکٹ لینز استعمال کرتے ہیں تو اس کی بجائے عینک استعمال کریں۔

## کیا کیا ساتھ لانا چاہیے

- آن ادویات کی ایک فہرست جو آپ گھر پر لیتے ہیں، بشمول پیشہ اور کریمیں۔
- آپ کا رسکیو انہیلر (جیسے کہ دم کے لیے الیوئرول)، اگر آپ کے پاس ہو تو۔
- آپ کی عینک رکھنا کے لیے ایک کھوکھا۔
- آپ کے یلٹھ کیئر پروکسی فارم، اگر آپ نے مکمل کیا ہو تو۔

## کہاں جانا ہے

آپ کی بالائی اینڈوسکوپی ان میں سے کسی ایک جگہ ہو گی:

- ڈیوڈ ایچ کوچ سینٹر  
530 ایسٹ 74 وین اسٹریٹ

نيويارك، NY 10021

لفٹ کی مدد سے 8 وین منزل پر جائیں ہے

● **میموریل اسپتال (MSK) کا مرکزی اسپتال** (میں اینڈوسکوپی سوئٹ

1275 یارک ایوبنیو (ایسٹ 67 وین اور ایسٹ 68 وین اسٹریٹس کے درمیان)

نيويارك، NY 10065

لفت B کے دوسرا منزل پر جائیں دائیں مژین اور شیشہ کے دروازے سے اینڈوسکوپی/سرجیکل

ڈے اسپیٹل سوئٹ میں داخل ہوں ہے

● MSK Monmouth

480 ریڈ ہل روڈ

NJ 07748 مڈل ٹاؤن،

[www.msk.org/parking](http://www.msk.org/parking) MSK کی تمام لوکیشنز کی ہدایات اور پارکنگ کی معلومات کے لئے ہے ملاحظہ کریں ہے

## وہاں کیا ہوگا آپ کے پہنچنے کے بعد

آپ کے پہنچنے کے بعد، آپ کو اپنا نام اور تاریخ پیدائش کئی بار بتانے کے لئے جائز گا ہے۔ آپ کے تحفظ کے لیے ہے وہ سکتا ہے کہ ایک ہی جیسے نام کے لوگوں کا طبی عمل اُسی دن ہو رہا ہے۔

اسپتال کا گاؤں پہنچنے کے بعد، آپ اپنے نرس سے ملیں گے وہ آپ کی ایک رگ، عموماً آپ کے اپنے اس کی رگ، میں انٹراوینس (IV) کیتھیٹر لگائے گا۔ آپ کو طبی عمل کے دوران اینستھیسیا (آپ کو سلانے والی دوا) دینے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ آپ کے طبی عمل سے پہلے آپ کو IV کے ذریعے مائع جات بھی دی جا سکتے ہیں۔

اپنے طبی عمل سے پہلے آپ اپنے ڈاکٹر سے بات کریں گے وہ طبی عمل کی وضاحت کریں گے اور آپ کے سوالات کے جواب دیں گے۔

## آپ کے طبی عمل کے دوران

جب آپ کے طبی عمل کا وقت ہو جائے گا، تو آپ طبی عمل کے کمرے میں جائیں گے اور آپ کو معائنہ کی ایک ٹیبل پر لٹا دیا جائے گا۔ آپ کا یہی لیٹھ کیئر فراہم کنندہ آپ کے دل، سانس، اور بلڈ پریشر کی نگرانی کے لیے ایک ایکوپیمنٹ تیار کرے گا۔ آپ کو ایک پتلی ٹیوب کے ذریعے آکسیجن دی جائے گی جو آپ کی ناک کے نیچے لگی ہوگی۔ آپ کے دانتوں کے اوپر ایک ماوتھ گارڈ بھی لگائے گا۔ تاکہ دانت محفوظ رہیں۔

آپ کو اپنے IV کے ذریعے اینستھیسیا دیا جائے گا، جس سے آپ سو جائیں گے۔ جیسے ہی آپ سوئیں گے،

آپ کا ڈاکٹر آپ کے منہ کے ذریعے اینڈوسکوپ داخل کر دے گا یہ آپ کی غذائی نالی کے نیچے آپ کے معدہ میں، اور آپ کی چھوٹی آنت میں چلا جائے گا آپ کا ڈاکٹر ٹشوک نمونہ لینے کے لیے بایوپسیز کرے گا، اگر ضرورت ہوئی تو پھر وہ اینڈوسکوپ نکال لے گا

## آپ کے طبی عمل کے بعد

آپ کا نرس آپ کے دل، سانس، اور بلڈ پریشر کی نگرانی جاری رکھے گا آپ کو گلے میں خراش محسوس ہو سکتی ہے اگر ایسا ہو، تو یہ 1 سے 2 دن میں ختم ہو جائے گی

جب آپ پوری طرح جاگ جائیں گے، تو آپ کا نرس آپ کا کا IV نکال لے گا اس سے پہلے آپ گھر روانہ ہوں، آپ کا نرس آپ کو ڈسچارج کی ہدایات بتائے گا

## گھر پر

اپنے طبی عمل کے 24 گھنٹے (1 دن) بعد تک کوئی الکوحل والے مشروبات نہ پینے

## اپنے معالج کو کب کال کی جائے

اگر آپ کو درج ذیل میں سے کسی علامت کا سامنا ہو تو اپنے یہ لیتھ کیئر فرائم کنندہ کو کال کریں:

- 101 °C (38.3 °F) یا اس سے زیاد کا درجہ حرارت
- سینے میں درد یا سانس میں تنگی (سانس مشکل سے آنا)
- آپ کے پیٹ (معدہ) میں شدید درد، سختی، یا سوچن
- آپ کی قہقہے (الٹی) میں خون آنا
- کمزوری، بہاؤ کی کیفیت، یا دونوں
- کوئی بھی دیگر سوالات یا خدشات

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m.

Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000

مزید وسائل کے لیے، [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) پر جا کر ماری ورچوئل لائبریری تلاش کریں۔

About Your Upper Endoscopy - Last updated on July 1, 2024  
تمام حقوق © زیر ملکیت اور محفوظ ہیں Memorial Sloan Kettering Cancer Center