



مریض اور نگران کے لیے تعلیم

## آپ کی اپر اینڈوسکوپي کے بارے میں

یہ معلومات آپ کو بالائی اینڈوسکوپي کے لیے تیار ہونے میں مدد دیں گی۔ اپر اینڈوسکوپي آپ کی غذائی نالی (کھانے کی نالی)، معدے، اور آپ کی چھوٹی آنت کے پے حصے کو دیکھنے کے لیے ایک ٹیسٹ ہے۔

آپ کی اپر اینڈوسکوپي کے دوران، آپ کا ہیلٹھ کیئر فراہم کنندہ ایک لچکدار ٹیوب استعمال کرے گا جسے اینڈوسکوپ کہتے ہیں۔ اس سے وہ ایک ویڈیو اسکرین پر آپ کی غذائی نالی، معدے، اور چھوٹی آنت کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ وہ ٹشو کا چھوٹا نمونہ بھی لے سکتے ہیں یا ایک ابھری ہوئی رسولی (ٹشو کی افزائش) کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس طبی عمل کو بایوپسی کہتے ہیں۔

### آپ کے طبی عمل سے 1 گھنٹہ پہلے

#### اپنی دوائیوں کے بارے میں پوچھیں

آپ کو اپنے طبی عمل سے پہلے اپنی کچھ ادویات کو لینا روکنا پڑ سکتا ہے۔ اپنے ڈاکٹر سے اس بارے میں بات کریں کہ کون سی دوائیوں کا استعمال بند کرنا آپ کے لیے محفوظ ہے۔ ذیل میں چند عمومی مثالیں دی ہیں۔

#### Anticoagulants (خون پتلا کرنے والی)

اگر آپ خون پتلا کرنے والی دوا (جو آپ کے خون کے جمنے کے طریقے کو متاثر کرتی ہے) لیتے ہیں تو آپ کا طبی عمل انجام دینے والے ہیلٹھ کیئر فراہم کنندہ سے پوچھیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ آپ کو دوا روکنے کی تجویز

دے سکتے ہیں اس کا انحصار آپ کے کیے جانے والے طبی عمل کی نوعیت اور آپ کی جانب سے خون پتلا کرنے والی دوا لینے کی وجہ پر ہوگا۔

عام خون پتلا کرنے والوں کی مثالیں ذیل میں درج ہیں اور بھی ہیں، اس لیے یقینی بنائیں کہ آپ کی دیکھ بھال کرنے والی ٹیم کو تمام ادویات معلوم ہیں جو آپ لیتے ہیں اپنی دیکھ بھال کرنے والی ٹیم کے ممبر سے بات کیے بغیر اپنا خون کورقیق کرنے کی دوا بند نہ کریں۔

- اپیکسابان (ایلیکوس<sup>®</sup>)
- ایسپرین
- سیلیکوکسب (سیلبریکس<sup>®</sup>)
- سیلوسٹازول (پلیٹل<sup>®</sup>)
- کلویڈوگریل (پلاویکس<sup>®</sup>)
- ڈیبیگٹران (پراڈاکسا<sup>®</sup>)
- ڈالٹپیرین (فریگمین<sup>®</sup>)
- ڈپیریڈمول (پرسنٹائن<sup>®</sup>)
- ایڈوکسابان (ساویسا<sup>®</sup>)
- اینوکساپارن (لووینکس<sup>®</sup>)
- فونڈاپارینکس (آریکسٹرا<sup>®</sup>)
- پیپارن (آپ کی جلد کے اندر شاٹ)
- میلوکسیکیم (مویک<sup>®</sup>)
- نان سٹرائڈل اینٹی سوزش آلی دوائیاں (این ایس اے آئی ڈیز)، جیسا کہ آئیپروفین (ایڈویل<sup>®</sup>)، موٹرن<sup>®</sup> اور نیپروکسن (ایلیو<sup>®</sup>)
- پینٹوکسفیلین (ٹرینٹل<sup>®</sup>)
- پراسوگریل (ایفینٹ<sup>®</sup>)
- ریواروکسابان (زیرلٹو<sup>®</sup>)
- سلفاسالازین (ازولفیڈین<sup>®</sup>)، سلفازین<sup>®</sup>)
- ٹکاگریلر (برلنٹا<sup>®</sup>)
- ٹنزاپیرین (انو پیپ<sup>®</sup>)
- وارفرین (جانٹووین<sup>®</sup>)، کوماڈین<sup>®</sup>)

## ذیابیطس کی ادویات

ممکن ہے آپ ذیابیطس کے لیے انسولین یا کوئی اور ادویات لے رہے ہوں۔ آپ

کو دووا کی تجویز دینا والا پیلٹھ کیئر فراہم کنندہ سے پوچھیں کہ آپ کو اپنا طبی عمل والا دن کی صبح کیا کرنا چاہیے اور سکتا ہے کہ آپ کو طبی عمل سے پہلے اپنی ادویات کی خوراک تبدیل کرنی پڑے۔

اپنا طبی عمل سے ایک دن پہلے یا اسی دن metformin (جیسے کہ Glucophage® یا Glumetza®) لیں یا کوئی بھی ایسی دوا نہ لیں جس میں metformin (جیسے کہ Janumet®) شامل ہو۔

## اگر آپ کو AICD ہے تو اپنا پیلٹھ کیئر فراہم کنندہ کو بتائیں

اگر آپ کو آٹومیٹک امپلانٹبل کارڈیوورٹر ڈیفبریلیٹر (AICD) ہے تو اپنا MSK پیلٹھ کیئر فراہم کنندہ کو بتائیں۔ اگر آپ کو AICD ہے، تو آپ کو اپنا طبی عمل MSK کے مرکزی اسپتال، میموریل اسپتال میں کروانا ہوگا۔

## اگر ضرورت ہے، تو اپنا ڈاکٹر سے ایک مراسلہ حاصل کریں

- اگر آپ کو آٹومیٹک امپلانٹبل کارڈیوورٹر ڈیفبریلیٹر (AICD) ہے، تو آپ کو اپنا طبی عمل سے پہلے اپنا کارڈیولوجسٹ (دل کے ڈاکٹر) سے ایک کلیئرنس لیٹر لینا ہوگا۔ کلیئرنس لیٹر وہ مراسلہ ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ بغیر کسی خطرے کے طبی عمل کروا سکتے ہیں۔
- اگر آپ کو گزشتہ 6 ہفتوں کے دوران سینے میں درد، سرچکرانہ، سانس لینے میں مشکل، یا بے ہوشی کا سامنا ہوا ہے، تو آپ کے ڈاکٹر کو آپ کا معائنہ کرنا ہوگا، اور اپنا طبی عمل سے پہلے اپنا ڈاکٹر سے ایک کلیئرنس لیٹر لینا ہوگا۔

آپ کے MSK ڈاکٹر کے دفتر میں آپ کا کلیئرنس لیٹر آپ کے طبی عمل سے کم از کم 1 دن پہلے لازماً پہنچ جانا چاہیے۔

## کسی کو آپ کے گھر لے جانے کا انتظام کریں

آپ کے پاس ایک ذمہ دار کیئر پارٹنر ہونا چاہیے جو آپ کے پروسیجر کے بعد آپ کو گھر لے جائے۔ ایک ذمہ دار کیئر پارٹنر ہونا چاہیے جو آپ کو محفوظ طریقہ سے گھر پہنچانے میں مدد کر سکتا ہے۔ اگر ان میں کوئی تشویش ہے تو وہ آپ کی کیئر ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنے پروسیجر کے دن سے پہلے اس کی منصوبہ بندی کو یقینی بنائیں۔

اگر آپ کو گھر لے جانے کے لیے آپ کے پاس کوئی ذمہ دار کیئر پارٹنر نہیں ہے، تو نیچے دی گئی ایجنسیوں میں سے کسی ایک کو کال کریں۔ وہ آپ کے ساتھ گھر جانے کے لیے کسی کو بھیجیں گے۔ اس سروس کے لیے ایک چارج ہے، اور آپ کو ٹرانسپورٹ فراہم کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ٹیکسی یا کار سروس استعمال کرنا ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی آپ کو اپنے ساتھ ایک ذمہ دار کیئر پارٹنر کی ضرورت ہے۔

### نیو جرسی میں ایجنسیاں

دیکھ بھال کرنے والے لوگ: 877-227-4649

### نیویارک میں ایجنسیاں

VNS ہیلتھ: 888-735-8913

دیکھ بھال کرنے والے لوگ: 877-227-4649

## آپ کے طبی عمل سے 3 دن پہلے

ایک اینڈوسکوپي نرس آپ کے طبی عمل سے 3 دن پہلے صبح 8 بجے سے شام 6 بجے کے درمیان آپ کو کال کرے گا/گی۔ وہ آپ کے ساتھ اس گائیڈ میں درج ہدایات کا جائزہ لے گا/گی اور آپ سے آپ کے سابقہ طبی ریکارڈ کے متعلق سوالات پوچھے گا/گی۔ نرس آپ کی ادویات کا بھی جائزہ لے گا/گی۔ وہ آپ کو بتائے گا/گی کہ اپنے طبی عمل کے دن کی صبح کونسی ادویات لینی

ہیں

انہیں درج کرنے کے لیے ذیل میں دی گئی جگہ استعمال کریں

## آپ کے طبی عمل سے ایک دن پہلے پروسیجر کا وقت نوٹ کریں

ایک اسٹاف ممبر آپ کے طبی عمل سے ایک دن پہلے دوپہر 12 بجے کے بعد آپ کو کال کرے گا اسٹاف ممبر آپ کو بتائے گا کہ آپ کو اپنا طبی عمل کے لیے کس وقت پہنچ جانا چاہیے اگر آپ کا طبی عمل پیر کے دن طے ہو، تو وہ آپ کو دو دن پہلے جمعے کو کال کرے گا اگر آپ کو کال نہ آئے، تو اپنا ہیلتھ کیئر فراہم کنندہ کے دفتر میں کال کریں

اگر آپ کو اپنا طبی عمل منسوخ کروانا ہو، تو اس ہیلتھ کیئر فراہم کنندہ کو کال کریں جس نے اسے آپ کے لیے طے کیا تھا

## کھانا کے لئے ہدایات



اپنی سرجری سے پہلے رات کو آدھی رات (12 بجے)  
کھانا بند کر دیں اس میں سخت ٹافی اور گم شامل ہیں

اگر آپ کے ہیلتھ کیئر فراہم کنندہ نے آپ کو آدھی رات سے پہلے کھانا بند کرنے کو کہا تو ان کی ہدایات پر عمل کریں کچھ لوگوں کو اپنی سرجری سے پہلے زیادہ دن خالی پیٹ رہنے کی ضرورت ہوتی ہے (کھانا نہیں)

# آپ کے پروسیجر کا دن

## پانی پینے کی ہدایات

آدھی رات کے درمیان (12 بجے رات) اور اپنی آمد کے وقت سے 2 گھنٹے پہلے، صرف نیچے دی گئی فہرست میں موجود مشروبات پئیں۔ اس کے علاوہ کچھ بھی نہ کھائیں یا پئیں۔ اپنی آمد سے 2 گھنٹے قبل پانی پینا بند کر دیں۔

● پانی

● سیب کا شفاف جوس، انگور کا شفاف جوس، یا کرین بیری کا شفاف جوس

● Gatorade یا Powerade

● سیاہ کافی یا سادے چائے چینی شامل کرنا ٹھیک ہے اس کے علاوہ کچھ بھی شامل نہ کریں۔

○ کسی بھی قسم کے دودھ یا کریمر کی کوئی سی بھی مقدار شامل نہ کریں۔ اس میں نباتات پر مبنی دودھ اور کریمرز شامل ہیں۔

○ شہد مت شامل کریں۔

○ ذائقہ دار سیرپ مت شامل کریں۔

اگر آپ کو ذیابیطیس ہے، تو ان مشروبات میں چینی کی مقدار پر توجہ دیں۔ اگر آپ شوگر فری، کم شوگر کے حامل، یا بنا شوگر شامل کئے ان مشروبات کے ورژنز شامل کرتے ہیں تو آپ کے بلڈ شوگر لیولز کو قابو میں رکھنا آسان ہو جائے گا۔

سرجری سے قبل پانی کی کمی پوری رکھنا مددگار ہوتا ہے، لہذا اگر آپ کو پیاس لگی ہے تو پانی پی لیں۔ اپنی ضرورت سے زیادہ پانی مت پئیں۔ آپ کو اپنی سرجری کے دوران نسون میں داخل کئے جانے والے سیال (IV) دئیے جائیں



اپنی آمد کو وقت سے 2 گھنٹے قبل پانی پینا بند کر  
دیں اس میں پانی شامل ہے

## اہم باتیں

- صرف وہی ادویات لیں جن میں آپ کو کھیلنے کیلئے فراہم کنندہ نے آپ کو  
آپ کو طبی عمل کی صبح لینے کو کہا تھا ان میں چند گھونٹ پانی کے  
ساتھ لیں
- کوئی بھی لوشن، کریم، پاؤڈر، میک اپ، پرفیوم یا کلون استعمال نہ  
لگائیں
- کوئی بھی جیولری، بشمول جسم پر کھدوائی ہوئی چیزیں اتار لیں
- قیمتی چیزیں (جیسے کہ کریڈٹ کارڈز اور جیولری) کو گھر پر ہی چھوڑ  
جائیں
- اگر آپ کانٹیکٹ لینز استعمال کرتے ہیں تو اس کی بجائے عینک استعمال  
کریں

## کیا کیا ساتھ لانا چاہیے

- ان ادویات کی ایک فہرست جو آپ گھر پر لیتے ہیں، بشمول پٹیاں اور  
کریمیں
- آپ کا ریسکیو انیلر (جیسے کہ دم کے لیے البیوٹیرول)، اگر آپ کے پاس  
ہو تو
- آپ کی عینک رکھنے کے لیے ایک کھوکھا

آپ کا ہیلتھ کیئر پروکسی فارم، اگر آپ نہ مکمل کیا ہو تو

## کہاں جانا

آپ کی بالائی اینڈوسکوپي ان میں سے کسی ایک جگہ کوگی:

### ڈیوڈ ایچ کوچ سینٹر

530 ایسٹ 74 ویں اسٹریٹ

نیویارک، NY 10021

لفٹ کی مدد سے 8 ویں منزل پر جائیں

### میموریل اسپتال (MSK کا مرکزی اسپتال) میں اینڈوسکوپي

#### سوئٹ

1275 یارک ایونیو (ایسٹ 67 ویں اور ایسٹ 68 ویں اسٹریٹس کے

درمیان)

نیویارک، NY 10065

لفٹ B پر دوسری منزل پر جائیں دائیں مڑیں اور شیشہ کے دروازے

سے اینڈوسکوپي / سرجیکل ڈی اسپٹل سوئٹ میں داخل ہوں

### MSK Monmouth

480 ریڈ ہل روڈ

مڈل ٹاؤن، NJ 07748

MSK کی تمام لوکیشنز کی ہدایات اور پارکنگ کی معلومات کے لئے

[www.msk.org/parking](http://www.msk.org/parking) ملاحظہ کریں

## وہاں کیا ہوگا

آپ کے ہینچنگ کے بعد

آپ کے ہینچنگ کے بعد، آپ کو اپنا نام اور نام کی جگہ اور تاریخ پیدائش کئی بار



بتازہ کو کھانا جائے گا۔ آپ کے تحفظ کے لیے سوچ سکتا ہے کہ ایک ہی جیسڈ نام کے لوگوں کا طبی عمل اسی دن پورا ہو۔

اسپتال کا گاؤن پہننے کے بعد، آپ اپنے نرس سے ملیں گے۔ آپ کی ایک رگ، عموماً آپ کے ہاتھ یا بازو کی رگ، میں انٹراوینس (IV) کیتھیٹر لگائے گا۔ IV آپ کو طبی عمل کے دوران اینسٹھیسیا (آپ کو سلاخ والی دوا) دینے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ آپ کے طبی عمل سے پہلے آپ کو IV کے ذریعے مائع جات بھی دیے جاسکتے ہیں۔

اپنے طبی عمل سے پہلے آپ اپنے ڈاکٹر سے بات کریں گے۔ وہ طبی عمل کی وضاحت کریں گے اور آپ کے سوالات کے جواب دیں گے۔

## آپ کے طبی عمل کے دوران

جب آپ کے طبی عمل کا وقت ہو جائے گا، تو آپ طبی عمل کے کمرے میں جائیں گے اور آپ کو معائنہ کی ایک ٹیبل پر لٹا دیا جائے گا۔ آپ کا ہلتھ کیئر فراہم کنندہ آپ کے دل، سانس، اور بلڈ پریشر کی نگرانی کے لیے ایک ایکویپمنٹ تیار کرے گا۔ آپ کو ایک پتلی ٹیوب کے ذریعے آکسیجن دی جائے گی جو آپ کی ناک کے نیچے لگی ہوگی۔ آپ کے دانتوں کے اوپر ایک ماؤتھ گارڈ بھی لگا ہوگا تاکہ دانت محفوظ رہیں۔

آپ کو اپنے IV کے ذریعے اینسٹھیسیا دیا جائے گا، جس سے آپ سو جائیں گے۔ جیسڈ ہی آپ سوئیں گے، آپ کا ڈاکٹر آپ کے منہ کے ذریعے اینڈوسکوپ داخل کر دے گا۔ آپ کی غذائی نالی کے نیچے آپ کے معدے میں، اور آپ کی چھوٹی آنت میں چلا جائے گا۔ آپ کا ڈاکٹر ٹشو کے نمونے لینے کے لیے بایوپسیز کرے گا، اگر ضرورت ہوئی تو پھر وہ اینڈوسکوپ نکال لے گا۔

## آپ کے طبی عمل کے بعد

آپ کا نرس آپ کو دل، سانس، اور بلڈ پریشر کی نگرانی جاری رکھے گا۔ آپ کو گلا میں خراش محسوس ہو سکتی ہے اگر ایسا ہو، تو یہ 1 سے 2 دن میں ختم ہو جائے گی۔

جب آپ پوری طرح جاگ جائیں گے، تو آپ کا نرس آپ کا IV نکال لے گا۔ اس سے پہلے آپ کو گھر روانہ ہوں، آپ کا نرس آپ کو ڈسچارج کی ہدایات بتائے گا۔

## گھر پر

اپنے طبی عمل کو 24 گھنٹے (1 دن) بعد تک کوئی الکوحل والے مشروبات نہ پیئیں۔

## اپنے معالج کو کب کال کی جائے

اگر آپ کو درج ذیل میں سے کسی علامت کا سامنا ہو تو اپنے ہیلتھ کیئر فراہم کنندہ کو کال کریں:

- 101 (38.3°C) یا اس سے زیادہ کا درجہ حرارت
- سینے میں درد یا سانس میں تنگی (سانس مشکل سے آنا)
- آپ کو پیٹ (معدے) میں شدید درد، سختی، یا سوجن
- آپ کی قے (الٹی) میں خون آنا
- کمزوری، بے ہوشی کی کیفیت، یا دونوں
- کوئی بھی دیگر سوالات یا خدشات

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000

مزید وسائل کے لیے، [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) پر جا کر ہمارے ورچوئل لائبریری تلاش کریں

About Your Upper Endoscopy - Last updated on July 1, 2024  
تمام حقوق Memorial Sloan Kettering Cancer Center کے زیر ملکیت اور محفوظ ہیں