



患者及照护者教育

# 如何预防误吸

本文解释了在进食、饮水或管饲过程中，可以采取哪些措施防止误吸。

## 关于误吸

误吸是指食物或液体进入气管，而不是食管。食道是将食物和液体从口中输送到胃里的管道。在吃饭、喝水或管饲时，可能会发生误吸。在发生呕吐或胃灼热时，也会发生误吸。

如果您存在吞咽困难，就会有误吸风险。因为食物和液体可能卡在喉咙后部，进入气管。误吸可能导致肺炎、呼吸道感染（鼻子、喉咙或肺部感染）和其他健康问题。

## 误吸的体征

吸入体征包括：

- 咳嗽
- 窒息
- 作呕
- 清嗓
- 呕吐

应该在您吃饭、喝水或管饲之前、期间和之后，您和看护人应注意这些体征。

如果您出现了上述任何体征，请停止进食、饮水或管饲。立即致电您的医疗保健提供者。

## 预防误吸

为防止经由口部进食和饮水时出现误吸，请遵循以下指南：

- 避免在进食和喝水时分心，如讲电话或看电视。
- 将食物切成易于咀嚼的小块。吞咽后始终要充分咀嚼食物。
- 缓慢进食和饮水。
- 如果可以，请坐直进食和饮水。
- 如果在床上进食或饮水，请使用楔形枕头将身体垫高。您可以在线购买楔形枕头，也可以在当地的医疗器材店购买。
- 进食或饮水后至少保持坐直姿势（至少呈 45 度）1 小时（见图 1）。




图  
1.  
呈  
45  
度  
角  
坐  
直

- 如果可能，请务必用楔形枕头将床头垫高。

如果您正在进行管饲，为防止误吸，请遵循下述指南：

- 如果可以，接受管饲时请坐直。
- 如果在床上接受管饲，请使用楔形枕头将身体垫高。您可以在在线购买楔形枕头，也可以在当地的医疗器材店购买。
- 接受管饲后至少保持坐直姿势（至少呈 45 度）1 小时（见图 1）。
- 如果可能，请务必用楔形枕头将床头垫高。

## 掌握管饲节奏

为预防误吸，掌握喂食节奏至关重要。为确保您的摄入量未超过您的消化能力，在管饲过程中请遵循以下指南：

- 如果您通过团注法进行管饲，每次管饲时注入的营养剂不得超过 360 毫升 (mL)。每次团注法管饲至少持续 15 分钟。
- 如果您通过重力法接受管饲，每次管饲时注入的营养剂不得超过 480 mL。每次重力法管饲至少持续 15 分钟。
- 如果您需要管饲至小肠（十二指肠或空肠）内，在输注营养剂时，管饲泵速率不得超过每小时 150 mL。

如有任何问题，请联系我们的临床营养师，电话：212-639-7312 或营养学高级执业医师 (APP)，电话：212-639-6984。

## 何时应联系您的医疗保健提供者

如果出现以下任何一种情况，请联系您的医疗提供方：

- 任何误吸体征，如咳嗽或作呕
- 发热达 100.4°F (38 °C) 或更高
- 呼吸困难
- 喘息
- 呼吸疼痛
- 咳嗽带粘液

如果您的呼吸问题没有好转，或出现其他紧急状况，请立即拨打 911 或到最近的急诊室就诊。

如果您有任何疑问，请直接联系您的医疗团队成员。如果您是 MSK 的患者，并需要在 下午 5:00 周末或节假日联系医务人员，请您致电 212-639-2000。

有关更多资源，请访问 [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe)，在我们的虚拟图书馆中进行搜索。

---

How to Prevent Aspiration - Last updated on December 12, 2022  
Memorial Sloan Kettering Cancer Center 拥有和保留所有权利