



患者及照护者教育

关于前列腺癌的低剂量率 (LDR) 近距离放射治疗

本信息将帮助您为即将在 MSK 接受的前列腺癌低剂量率 (LDR) 近距离放射治疗做好准备。

请您在近距离放射治疗前至少阅读一次本资源。 请将该指南作为治疗前几天的参考使用。

关于前列腺

前列腺是一个小而紧实的腺体，约有核桃大小。它与人体其他腺体共同发挥功能产生精液。



图
1.
前
列
腺
及
附
近
器
官

前列腺位于直肠前方，膀胱下方（见图 1）。它围绕着尿道，即将尿液从膀胱排出的管道。

关于近距离放射治疗

近距离放射治疗是用于治疗前列腺癌的一种放射治疗。

放射治疗利用高能辐射治疗癌症。它的工作原理是破坏癌细胞，使它们难以繁殖。随后

人体能够自然代谢掉这些受损的癌细胞。放射治疗也会影响到正常细胞，但正常细胞能够以癌细胞无法实现的方式进行自我修复。

在近距离放射治疗中，医疗保健提供者会将非常小的放射性植入物（也称放射性粒子）植入前列腺内。每个粒子大约芝麻样大小。这些粒子会在一定时间内发出辐射，然后停止。它们将始终留在您的前列腺内，伴随您余生。

关于放射性粒子

放射性粒子将由放射性碘 (I-125) 或钯 (Pd-103) 制成，并外覆钛。您的放射肿瘤医生将会告知您最好的选择方案。医疗保健提供者将会为您植入 50 到 125 颗放射性粒子。植入的数量取决于您前列腺的大小。

辐射安全委员会给您一张卡片，让您在手术后随身携带。卡片上会写明您正在接受放射治疗，并注明进行放射治疗的日期。如果出于任何原因，您需要在卡片日期之前去医院，请告知医疗保健提供者您体内已植入放射性粒子。

您在放射治疗团队中扮演的角色

我们将会为您安排一个医疗保健提供者团队，共同为您提供优质的医疗照护。您也是团队中的一员，您负责的事项包括：

- 按时赴诊。
- 提出您的疑问并说出您的忧虑。
- 当您出现副作用时，请告知放射治疗团队的成员。
- 当您感到疼痛时，请告知放射治疗团队的成员。
- 通过以下方式进行居家护理：
 - 如果您吸烟的话，您需要戒烟。MSK 的专员可以帮助您戒烟。如果您需要了解更多关于烟草治疗项目的信息，请致电 212-610-0507 联系我们。您也可以向护士询问该项目的信息。
 - 请按照您放射治疗团队的指示摄入液体。
 - 请摄入您放射治疗团队建议的食物。
 - 保持体重不变。

为手术做好准备

您和您的医疗团队将共同为手术做准备。即使您不确定，也请告知我们以下情况是否适用于您，以帮助我们保护您的安全。

- 我在使用抗凝剂（血液稀释剂药物），例如：

- 阿司匹林
- 肝素
- 华法林 (Jantoven®、Coumadin®)
- 氯吡格雷（波立维®）
- 依诺肝素 (Lovenox®)
- 达比加群（泰毕全®）
- 阿哌沙班（艾乐妥®）
- 利伐沙班 (拜瑞妥®)

以下是药物示例。还有其他类型的血液稀释药物。

请务必确保您的保健提供者了解您正在服用的所有药物。

- 我在使用 SGLT2 抑制剂，例如：

- 卡格列净 (Invokana®)
- 达格列净 (Farxiga®)
- 恩格列净 (Jardiance®)
- 埃格列净 (Steglatro®)

- 我在使用处方药（包括贴剂和乳膏）。处方药是指只能凭医疗保健提供者开具处方才可获得的药物。
- 我在使用非处方药（包括贴剂和乳膏）。非处方药是指无需开具处方即可购买的药物。
- 我在摄入膳食补充剂，比如草药、维生素、矿物质、天然或家庭疗法。
- 我装有起搏器、自动植入式心脏复律除颤器 (AICD) 或其他心脏装置。
- 我患有睡眠呼吸暂停。
- 我既往使用麻醉药出现过问题。手术期间，会对您进行麻醉（使用药物使您入睡）。
- 我对某些特定药物或材料（包括胶乳）过敏。
- 我不愿意接受输血。

- 我饮酒。
- 我吸烟或使用电子吸烟设备（如 vape pen 或电子烟）。
- 我服用娱乐性毒品，例如大麻。

术前检查 (PST)

您将在手术前进行术前检查预约 (PST)。您将从医疗保健提供者办公室收到预约日期、时间和地点的相关提醒。

您可以在预约 PST 当天进食和服用常规药物。

前去接受术前检查时，随身携带这些物品将对您有所帮助：

- 您服用的所有药物的清单，包括处方药、非处方药、贴片和药膏。
- 过去一年中在 MSK 以外进行的任何医学检查（如有）的结果。示例包括心脏负荷试验、超声心动图或颈动脉多普勒检查结果。
- 您的医疗保健提供者的名字和电话号码。

在 PST 预约期间，您将会见一位高级实践提供者 (APP)。他们会与 MSK 的麻醉科医生密切合作。在手术期间，经过专业培训的医生将为您施用麻醉药物。

您的 APP 会与您一起查看您的医疗和手术病史。您可能需要接受一些医学检查来安排您的照护事宜，例如：

- 心电图 (EKG)，用于检查您的心律。
- 胸部 x 线检查。
- 血液检查。

您的 APP 可能会建议您去会见其他医疗保健提供者。他们也会告知您手术日早晨应该服用哪些药物。

关于饮酒

向保健提供者诚实说明您的饮酒量，这很重要。这将有助于我们为您制定医疗照护计划。

如果您经常饮酒，您在手术过程中和手术后可能存在发生问题的风险。其中包括出血、

感染、心脏问题和住院时间延长。

如果您定期饮酒并突然戒酒，可能导致癫痫发作、谵妄和死亡。如果我们了解到您有出现这些问题的风险，我们可以开具处方药物来帮助预防。

您可以在术前采取以下措施来防止出现问题。

- 向保健提供者诚实说明您的饮酒量
- 当确定您的手术计划之后，请尝试停止饮酒。如果您出现以下情况，请立即告知您的医疗保健提供者：
 - 头痛。
 - 感觉恶心（感觉想吐）。
 - 感觉比平时更焦虑（紧张或担忧）。
 - 无法入睡。

这些均为戒酒的早期征兆，可以进行治疗。

- 如果您无法停止饮酒，请告知您的医疗保健提供者。
- 如有关于饮酒和手术的疑问，您都可咨询医疗保健提供者。我们将一如既往地确保您所有医疗信息的保密性。

关于吸烟

如果您吸烟，接受手术时您可能会出现呼吸问题。即使在手术前仅停止吸烟几天，都会对您有帮助。

如果您吸烟，您的医疗保健提供者会将您转诊至我们的[烟草治疗项目](#)。您也可以致电 212-610-0507 与本项目取得联系。

关于睡眠呼吸暂停

睡眠呼吸暂停是一种常见的呼吸问题。如果您患有睡眠呼吸暂停症，您会在睡眠期间短时间内停止呼吸。最常见的类型是阻塞性睡眠呼吸暂停 (OSA)。OSA 患者在睡眠期间会发生气道完全阻塞。

OSA 可能会在术中和术后引起严重问题。请告知我们您是否患有或认为您可能患有睡眠呼吸暂停。如果您使用呼吸机（如持续性正压呼吸器 (CPAP)），请在手术当天随身携带

带。

安排人接您回家

疗程后请务必确保有一名负责的照护者接您回家。负责的照护者必须能够帮助您安全回到家中。如果他们有任何问题，应能够联系您的医疗团队。请务必在疗程开始前将此事安排好。

如果没有负责的照护者接您回家，您可以致电以下服务机构。他们会安排人送您回家。此项服务需要付费，并且您需要提供交通工具。您可以乘坐出租车或使用汽车服务，但必须保证有一个负责的照护者陪同。

纽约的服务机构

VNS 健康：888-735-8913

Caring People：877-227-4649

新泽西的服务机构

Caring People：877-227-4649

填写医疗保健代理表格

如果您尚未填写医疗保健代理表格，我们建议您立即填写。如果您已经填写了一个或有任何其他预先指示，请将其带到您的下一次约会中。

医疗保健代理是一份法律文件。它说，如果你不能为自己沟通，谁会为你说话。这个人被称为您的医疗保健代理人。

- 要了解医疗保健代理和其他预先指示，请阅读 *癌症患者及其亲人的预立医疗照护计划* (<https://sandbox18.mskcc.org/zh-hans/cancer-care/patient-education/advance-care-planning>)。
- 要了解如何成为医疗保健代理，请阅读 *如何担任医疗护理代理人* (<https://sandbox18.mskcc.org/zh-hans/cancer-care/patient-education/how-be-health-care-agent>)。

如果您对填写医疗保健代理表格有疑问，请与您的护理团队成员交谈。

进行体力活动

进行体力活动有助于您的身体达到最佳状态以迎接手术。此外，还可以使您恢复得更快、更容易。

尽量每天进行体力活动。任何使您心跳加快的运动（如散步、游泳或骑自行车）都是不

错的选择。如果外面很冷，可以使用家里的楼梯，或前往商场或购物中心

遵循健康饮食

手术前，应遵循均衡健康的饮食。如果您需要饮食方面的帮助，请告知保健提供者安排您与营养师和营养学家会面。

购买用品

您需要购买以下用品：

- ☐ 比沙可啶 (Dulcolax®) 5 mg 片剂。您可以在当地的药房买到，不用开处方。它们通常以 10 片一盒售卖，但您只需服用一片。
- ☐ NuLYTELY® 溶液和口味包（樱桃味、柠檬-青柠味、桔子味和菠萝味）。您的医疗保健提供者将为您开具此药的处方。该溶液以 1 加仑（128 盎司）瓶装出售，不过您只需要喝 ½ 加仑（64 盎司）。
- ☐ 当您实行清流质饮食时，可饮用额外的清流质。示例参见“清流质饮食”表。

手术前 7 天

遵循保健提供者关于服用阿司匹林的指示

阿司匹林可能会导致出血。如果您服用阿司匹林或含有阿司匹林的药物，您可能需要在手术前 7 天改变剂量或停止服用。请遵循医疗保健提供者的指导说明。未得到医疗保健提供者的指示时，请勿随意停用阿司匹林。

如需了解更多信息，请阅读*如何确定药物或补充剂中是否含有阿司匹林、其他 NSAID、维生素 E 或鱼油* (<https://sandbox18.mskcc.org/zh-hans/cancer-care/patient-education/common-medications-containing-aspirin-and-other-nonsteroidal-anti-inflammatory-drugs-nsaids>)。

停止服用维生素 E、复合维生素、草药和其他膳食补充剂

使用维生素 E、复合维生素、草药和其他膳食补充剂可能导致出血。请在手术前 7 天停用此类药物。如果您的医疗保健提供者为您提供了其他指导说明，请遵循相应说明。

如需了解更多信息，请阅读*草药疗法和癌症治疗* (<https://sandbox18.mskcc.org/zh-hans/cancer-care/patient-education/herbal-remedies-and-treatment>)。

手术前 2 天

停用非甾体抗炎药 (NSAID)

使用 NSAID（如布洛芬（Advil® 和 Motrin®）和萘普生（Aleve®））可能导致出血。请在手术前 2 天停用此类药物。如果您的医疗保健提供者为您提供了其他指导说明，请遵循相应说明。

如需了解更多信息，请阅读[如何确定药物或补充剂中是否含有阿司匹林、其他 NSAID、维生素 E 或鱼油](https://sandbox18.mskcc.org/zh-hans/cancer-care/patient-education/common-medications-containing-aspirin-and-other-nonsteroidal-anti-inflammatory-drugs-nsaids) (<https://sandbox18.mskcc.org/zh-hans/cancer-care/patient-education/common-medications-containing-aspirin-and-other-nonsteroidal-anti-inflammatory-drugs-nsaids>)。

手术前 1 天

准备好 NuLYTELY 混合液

手术前一天早晨：

1. 向 NuLYTELY 瓶中加入温水。将水灌装至瓶上刻度线的顶部。
2. 添加您喜欢的口味包。仅能使用 NuLYTELY 附带的口味包。
3. 将 NuLYTELY 的瓶盖盖上。振摇 NuLYTELY 瓶直至粉末溶解。即使您使用了口味包，混合液也将保持澄清。
4. 如果您喜欢，您可以将其放入冰箱冷藏。许多人已经告诉我们 NuLYTELY 冷的时候口感更好。

请勿早于手术前一天的早晨混合 NuLYTELY。

遵循清流质饮食

您的早饭和午饭可以吃固体食物。请在中午 12 点前吃完午饭。

手术前一天午餐后，请开始实行清流质饮食。清流质饮食仅包括您能一眼看清至杯底的液体。示例请参考“清流质饮食”表格。实行清流质饮食时：

- 忌食固体食物。
- 在您清醒的情况下，每小时至少饮用 1 杯（8 盎司）清流质。

- 饮用不同类型的清流质。请勿只喝水、咖啡和茶。
- 请勿饮用超过 2 杯（16 盎司）含咖啡因的液体。
- 即使患有糖尿病，也请勿饮用减肥液体。如果您饮用减肥液体，您可能会感觉虚弱或眩晕。

清流质饮食		
	可以饮用	不可以饮用
汤类	● 清澈的浓汤、肉菜清汤和法式清汤。	● 任何含有食物块或调味品的食品。
甜品	● 果冻，比如 Jell-O®。 ● 各种口味的冰品。 ● 硬糖，如 Life Savers®、柠檬糖果和薄荷糖。	● 所有其他甜品。
饮品	● 透明的果汁（如柠檬水、苹果汁、蔓越莓汁和葡萄汁）。 ● 汽水（如姜汁汽水、七喜®、雪碧® 或苏打水）。 ● 运动饮料，如佳得乐® 和 Powerade®。 ● 咖啡（不含牛奶或奶精）。 ● 茶（不含牛奶或奶精）。 ● 水，包括碳酸（气泡）水和加味水。 ● 透明营养饮料，如 Boost® Breeze、Ensure Clear™、Pedialyte® 和 Diabetishield®。	● 含果肉的果汁。 ● 果肉饮料 (Nectars)。 ● 冰沙或奶昔。 ● 牛奶、奶油和其他乳制品。 ● 坚果奶、植物奶、非乳制品奶油和其他乳制品替代品。 ● 含酒精的饮料。

服用 1 片比沙可啶

在您手术前一天的下午 1 点，含水吞服 1 片 (5 mg) 比沙可啶。

饮用 NuLYTELY 混合液

在您手术前一天的下午 3 点，开始饮用 NuLYTELY 混合液。

- 每 15 分钟饮用 1 杯（8 盎司）混合液。
- 仅饮用一半的 NuLYTELY 溶液（64 盎司）。您可以使用瓶子上的刻度线来帮助跟踪饮用量。
- 当您饮用完一半的 NuLYTELY 混合物后，请将另一半丢弃。然后，继续饮用清澈流

质。

NuLYTELY 会导致排便频繁，因此当您开始饮用时，请务必靠近洗手间。为了帮助预防刺激，每次排便后，您可以在肛门周围的皮肤上涂抹凡士林 (Vaseline®) 或 A&D® 软膏。

请注意您的手术时间

入院处的一名工作人员将在您的手术前一天下午 2:00 后致电联系您。如果您的手术安排在周一，他们会在周五提前致电联系您。如果您在晚上 7 点前未接到电话，请致电 212-639-5014。

工作人员会告知您应该于何时到达医院接受手术。他们还会提醒您接受手术的地点。您的手术将在以下地点进行：

Memorial Hospital
约克大道 1275 号（东 67 大街与 68 大街之间）
纽约，邮编 NY 10065
乘坐 B 电梯到达 6 楼。

如果您的健康状况发生任何变化或出于任何原因需要取消手术，请致电您的放射肿瘤医生。


遵医嘱服药

请服用医疗保健提供者告知您在手术前一晚服用的药物。抿一小口水服用它们。

淋浴

请在手术前一晚或第二天早晨用肥皂和水沐浴。

饮食指导说明：抵达前 8 小时



- 如果尚未停止进食，请在抵达时间前 8 小时停止进食。
 - 医疗保健提供者可能会让您早点停止进食。如被告知，请遵循其指示。
- 在抵达时间前 8 小时，除以下清流质以外，请勿进食或饮用任何东西：
 - 水。

- 苏打。
- 透明果汁（如柠檬水、苹果汁和蔓越莓汁）。请勿饮用橙汁或带果肉的果汁。
- 黑咖啡或茶（不含任何牛奶或奶精）。
- 运动饮品，如佳得乐 Gatorade®。
- 果冻，比如 Jell-O®。

您可以持续饮用，直至抵达时间前 2 小时。

手术当天

液体摄入指导说明：抵达前 2 小时



抵达前 2 小时停止饮用。包括水。

注意事项

- 请服用医疗保健提供者告知您在手术当天早晨服用的药物。抿一小口水服用它们。
- 请勿使用任何乳液、护肤霜、除臭剂、化妆粉或古龙水。
- 请勿穿戴任何金属物品。摘除所有饰物，包括穿体装饰。手术过程中使用的器械如果接触到金属，可能会导致灼伤。
- 请将贵重物品留在家中。
- 如果您平时戴隐形眼镜，请用镜框眼镜代替。如果您没有框架眼镜，请带一个装隐形眼镜的盒子。

随身携带的物品

- 一条宽松的裤子，比如宽松的运动裤。
- 三角内裤，比您日常穿的型号大 1 至 2 个号。
- 系鞋带的运动鞋。您的脚可能会出现些许肿胀。系鞋带的运动鞋可以适应这种肿胀。

泊车位置

MSK 的停车场位于约克大道和第一大道之间的东 66 大街。如果您对价格有疑问，请致电 212-639-2338。

要到达停车场，请从约克大道转入东 66 大街。停车场距离约克大道约四分之一街区，位于大街的右侧（北侧）。有一条隧道连接车库和医院，可供您步行通行。

其他停车场位于：

- 东 69 大街（第一大道和第二大道之间）。
- 东 67 大街（约克大道和第一大道之间）。
- 东 65 大街（第一大道和第二大道之间）。

前往何处

抵达医院后，请乘坐电梯 B 到 6 层术前中心。在候诊室的服务台进行登记。

可能发生的情况

许多工作人员会要求您说出并拼写出您的姓名和出生日期。这是为了您的安全考虑，姓名相同或相似的患者可能会在同一天接受手术。

当您该手术更衣时，您将领取医院病号服、长袍和防滑袜。

与护士见面

您将在手术之前与您的护士见面。请将您在午夜（凌晨 12:00）之后服用的任何药物的剂量及服用时间告知他们。请确保包括处方药、非处方药、贴片和药膏。

护士可能会在您的一根静脉中放置一根静脉注射 (IV) 管线，通常是您的手臂或手上的静脉。如果护士没有放置静脉注射管线，麻醉师可能会在手术室里进行此操作。

为手术做准备

到了放疗的时间时，您需要取下助听器、假牙、假肢、假发和宗教物品（如果有）。您将自己走进手术室，或者躺在担架上被工作人员抬入手术室。

手术室团队有一名成员会帮助您上手术台。工作人员还会将压缩靴穿戴于您的小腿上。它们可以缓慢充气或放气，促进您腿部的血液循环。当您感觉舒适后，麻醉师会通过您的静脉注射管线为您施用麻醉药，让您入睡。在手术过程中和手术后，您还将通过静脉

注射管线接受液体输送。

手术期间

在您完全入睡后，您的医疗团队将从您的嘴部放置一根呼吸管（抵达气管）来帮助您呼吸。他们还将在您的膀胱中放置一根导尿管 (Foley)，用来在放疗过程中引流尿液。

放置好 Foley 导尿管后，医疗保健提供者将使用直肠超声检查您的前列腺。他们会将非常小的针头穿过会阴置入到您的前列腺内。会阴是阴囊和肛门之间的皮肤区域（见图 1）。您的医疗保健提供者将使用计算机确定放置放射性粒子的最佳位置。然后，他们将通过这些针头将粒子放置到您的前列腺中。

您将接受计算机断层扫描 (CT)，以确保所有放射性粒子放置在正确的位置。然后，医疗保健提供者会取出针头和 Foley 导尿管。

手术后

在医院时

您将在麻醉复苏室 (PACU) 里醒来。护士会追踪记录您的体温、脉搏、血压和氧气水平。他们还将确保您能自行排尿（小便）。

您在手术后可能会有一些疼痛。医疗保健提供者会经常询问您的疼痛情况，他们会根据需要提供药物来缓解疼痛。如果您的疼痛没有缓解，请告知医疗保健提供者。

您的护士将向您和您的照护者解释出院后的相关注意事项。

与您的辐射安全委员会面

您将与辐射安全处的一位辐射安全员会面。他们会检查您体内的辐射水平。他们还会给您一张钱包卡，让您在放疗后随身携带 6 个月。卡片上会说明进行放射治疗的原因，并注明进行放射治疗的日期。如果出于任何原因，您需要在卡片日期之前去医院，请告知医疗保健提供者您体内已植入放射性粒子。

辐射安全员可能还会向您说明您在家人和朋友身边时需要采取的任何辐射预防措施。

居家

过滤尿液

虽然非常罕见，但您可能会将放射性粒子随尿液排出。但这并不会影响您的治疗。出院

前，您的护士会给您一个过滤器。在放疗后的前 4 天，请使用该过滤器对您的尿液进行过滤。如果您在头 4 天排出一粒放射性粒子，在接下来的 4 天里请继续过滤您的尿液。

如果您排出放射性粒子，请不要用手或手指触摸它。请用勺子或镊子把它夹起来。把它放在一个有盖的小容器中，比如一个空罐子。把它存放在远离人群的地方。如需更多指导说明，请致电 212-639-7391 联系您的放射肿瘤医生或辐射安全处。

其他须知

- 如果会阴出血，请用干净的干毛巾或纱布持续按压 5 分钟。如果流血变多或出血不止，请致电您的医疗保健提供者。
- 您可以恢复日常饮食。您最好能够避免食用可能刺激膀胱的食物。其中包括咖啡因（比如咖啡和茶）、酒精、柑橘类果汁和辛辣的食物等。
- 您在出院 24 小时后可以淋浴。
- 在放疗后 1 周内，请勿举起任何超过 20 磅（9.1 公斤）重的东西。
- 大多数人可以在术后 2 天返回工作岗位。如果您的工作需要举起重物，请咨询您的医疗保健提供者您何时才能重返工作。

随访护理

在低剂量率近距离放射治疗后，您将会与您的医疗保健提供者进行常规看诊。每次看诊时，放射治疗团队将检查您的身体状态以及癌症对治疗的反应。您将接受体格和血液检查，包括前列腺特异性抗原检测 (PSA)。您的医疗保健提供者还将帮助您管理您出现的任何症状。您可以通过这些随访提出您的疑问并说出您的忧虑。

副作用

泌尿症状

泌尿症状是近距离放射治疗最常见的副作用。手术后，您可能会有以下一些症状。

- 有些人在手术后无法排尿，或者一次只能排出几滴。这属于一种紧急情况。如果您无法排尿，请立即致电您的保健提供者。
- 您可能需要比平常更频繁的排尿，多达一个小时 1 次或更多次。这种情况通常在放射性粒子植入后 2 至 4 周开始出现，并可能会持续几个月或更长时间。
- 您在排尿时可能会有烧灼感。这种情况通常在放射性粒子植入后 2 至 4 周开始出现，

并可能会持续 4 个月到 1 年。

- 您可能会注意到您的尿液中有血液，这会使尿液看上去呈粉红色。这很常见，通常会在放射性粒子植入后 3 至 7 天消失。如果 7 天后您的尿液还是粉红色，或者您的尿液中有血块，请致电您的医疗保健提供者。
- 您的阴囊和阴茎周围可能会出现淤血。这种情况应该会在您手术后 1 至 2 周消失。如果 2 周后还有淤血，请致电您的医疗保健提供者。

如果您出现了上述任何症状，请咨询您的医疗保健提供者。如果您计划进行膀胱检查（如膀胱镜检查），请先咨询您的医疗保健提供者，然后再接受检查。

肠道症状

- 您的排便可能比平时更频繁或大便质地更软。当直肠受到刺激时会发生上述情况。这通常在放射性粒子植入后 1 周开始，并可能会持续数月或更久。
- 您可能会出现直肠不适或粘液排出。
- 如果您有痔疮，症状可能会加重。

如果您有任何肠道症状，请咨询您的医疗保健提供者。如果您计划进行直肠或结肠检查（如结肠镜检查），请先咨询您的医疗保健提供者，然后再接受检查。

勃起功能障碍 (ED)

勃起功能障碍，有时被称为阳痿，意思是不能勃起或勃起困难。您可能会注意到勃起强度发生变化。您可能会出现射精量减少，或者射精稠度可能与以往不同。

在每 10 名接受前列腺低剂量率近距离放射治疗的患者中，大约有 3 名患者会在术后 5 年内发生 ED，剩余大约 7 名不会发生该问题。很难预测哪些患者会发生勃起功能障碍 (ED)。

如果您患上了 ED，它可能是永久性的。如果您出现 ED，请告知您的医疗保健提供者。有很多治疗 ED 的方法。

辐射安全注意事项

前列腺中的放射性粒子由钯 (Pd-103) 或碘 (I-125) 制成。如果您不确定您使用的是哪一种，请询问您的保健提供者。

如果您植入了钷，您无需再遵循这些注意事项。如果您植入了碘（I-125），您需要遵循这些注意事项。

放射性粒子会释放极少量的辐射。越远离您的身体，辐射量就越少。3 英尺（1 米）外无可测量辐射。

被您接触过的物体不会具备放射性。您不必对床单、衣服、盘子或浴室进行任何特殊处理。这些放射性粒子不会干扰心脏起搏器或微波炉。

请务必遵守辐射安全员提供的卡片上的所有说明，包括避免将孩子抱在大腿上以及和您的伴侣以勺子状的姿势睡觉等。

性行为安全预防措施

您可以在放疗后一周恢复性生活。

有时（非常罕见），当您射精时，其中一粒放射性粒子会从前列腺排出。请至少在放疗后前 5 次射精时使用避孕套或在伴侣体外进行射精。如果您的伴侣怀孕了，在孩子出生之前请使用避孕套。您可以借此检查射精中是否有放射性粒子。它还可以减轻您对术后射精能力的担忧。

如果您在射精时排出放射性粒子，请致电您的放射肿瘤医生或辐射安全员。按照“过滤排尿”章节中的说明捡拾并储存放射性粒子。

旅行

您可以旅行，包括坐乘坐飞机。请随身携带辐射安全员给您的钱包卡。某些安全设备可能探测到放射性物质或金属。

体液

放射性粒子的辐射不会进入您的血液、尿液或其他体液。您不需要遵循任何特殊的操作。

支持服务

入院处

212-639-7606

如果您对住院有任何疑问，包括要求提供私人病房，请致电联系我们。

麻醉科

212-639-6840

您可以致电询问有关[麻醉](#)的问题。

男性性医学与生殖医学项目

646-888-6024

癌症和癌症治疗可能会影响您的性健康、生育能力或两者兼有。我们的[男性性医学和生殖医学项目](#)可以为您提供性健康相关问题的帮助，比如勃起功能障碍 (ED)。我们可以在您接受治疗前、治疗期间或治疗后为您提供帮助。您可以致电了解更多相关信息或进行预约就诊。

患者代表办公室

212-639-7202

如果您有关于医疗保健代表委托书的任何问题，或者对您的医疗照护有任何顾虑，请致电患者代表办公室。

社会工作

www.msk.org/socialwork

212-639-7020

社会工作者可帮助患者、其家庭和朋友处理癌症患者常遇到的问题。他们可在整个治疗过程中为您提供个人咨询和支持小组服务。他们可以帮助您与孩子和其他家庭成员进行沟通。

我们的社工还可以帮助您转诊至社区机构和相关项目。如果您在支付账单方面遇到困难，他们也可以为您提供财务资源方面的信息。

何时电话联系您的医疗保健提供者

如果出现以下情况，请致电您的医疗保健提供者：

- 发热 $\geq 101^{\circ}\text{F}$ (38.3°C) 。
- 无法通过药物缓解的疼痛。
- 任何新的症状或身体变化。

联系信息

如果您有问题或顾虑，请与您放射治疗团队的成员讨论。您可以在周一至周五上午 9:00 至 下午 5:00 通过以下电话号码与他们取得联系。

放射肿瘤医生： _____

电话： _____

放射科护士： _____

电话： _____

下午 5:00 后或在周末和节假日，请致电 212-639-2000。请接线员为您找来值班的放射肿瘤医生。

有关更多资源，请访问 www.mskcc.org/pe，在我们的虚拟图书馆中进行搜索。

About Your Low Dose Rate (LDR) Brachytherapy for Prostate Cancer - Last updated on July 17, 2023

Memorial Sloan Kettering Cancer Center 拥有和保留所有权利